

# Die Fauna Südwest-Australiens.

Ergebnisse der Hamburger  
südwest-australischen Forschungsreise 1905

herausgegeben von

Prof. Dr. W. Michaelsen und Dr. R. Hartmeyer.

==== Band II, Lieferung 9—13. ====

## Inhalt:

- Lief. 9. **Blattidae** by R. Shelford, Oxford.  
Lief. 10. **Copelata und Thaliacea** von H. Lohmann, Kiel.  
Lief. 11. **Marine Hydrachnidae und Halacaridae** von H. Lohmann,  
Kiel.  
Lief. 12. **Araneae**, 2<sup>me</sup> Partie, par Eugène Simon, Paris.  
Lief. 13. **Ptinidae** von M. Pic, Digoïn.

Mit einer Tafel und 17 Abbildungen im Text.



Verlag von Gustav Fischer in Jena.  
1909.

# Die Fauna Südwest-Australiens.

Ergebnisse der Hamburger  
südwest-australischen Forschungsreise 1905

herausgegeben von

Prof. Dr. W. Michaelsen und Dr. R. Hartmeyer.

==== Band II, Lieferung 12. ====

## Araneae,

2<sup>me</sup> partie,

par

**Eugène Simon,**

président honoraire de la société entomologique de France  
(Paris).

Avec 14 figures dans le texte.



Verlag von Gustav Fischer in Jena.  
1909.

Alle Rechte vorbehalten.

Dans cette seconde partie nous parlerons d'abord de quelques espèces, retrouvées dans les récoltes de MM. W. MICHAELSEN et R. HARTMEYER et appartenant à des familles étudiées dans la première partie, deux d'entre elles sont intéressantes au point de vue de la classification des *Araneae*:

Le nouveau genre *Trachytrema* est voisin du genre si ambigu *Trachycosmus* que nous n'avions rattaché qu'avec doute au groupe des *Hemicloeiinae* (Hist. nat. Ar., I, p. 347), il fait presque le passage de ce genre aux *Hemicloea* vrais et confirme la place que nous lui avons donnée un peu par intuition.

Le genre *Cerygerda* offre tous les caractères des *Myandra* et *Molycria* sauf en ce qui concerne les filières, qui sont apicales, petites et rapprochées comme celles des *Micaria*; le groupe anormal des *Molycria*, pour lequel nous avons proposé une sous-famille (1<sup>re</sup> partie p. 442), se trouve ainsi reliée doublement aux *Clubionides* ordinaires, d'une part par les *Sphingius*, d'autre part par les *Cerygerda*.

La sous-famille des *Selenopinae* est représentée par le *Selenops australiensis* L. KOCH, qui se trouve aussi dans l'Australie orientale, on sait que les espèces de ce genre ont en général de vastes habitats.

L'étude d'une série d'espèces des sous-familles *Cteninae* et *Liocraninae* a modifié nos idées sur les limites et la répartition en groupes secondaires, de ces deux sous-familles.

Nous avons vu deux espèces du genre *Argoctenus* L. KOCH et pu reconnaître que ce genre n'était point synonyme de *Miturgina*, comme nous le pensions, il en résulte que la diagnose que nous en avons donnée, d'après *Miturgina vittata* E. S., de Nouvelle-Calédonie, est complètement à modifier (Hist. nat. Ar., II, p. 132); *Argoctenus* est au fond plus voisin de *Caloctenus* que de *Miturga*.

Deux genres nouveaux *Elassoctenus* et *Hestimodema* sont assez voisins des *Odo* et le second offre même certains caractères des *Zora* et surtout des *Ctenomma*. D'un autre côté les *Miturga* sont reliés aux *Caloctenus* par les *Miturgina*, il en résulte que les deux groupes *Miturgeae* et *Zoreae*, que nous rattachions à la sous-famille des *Liocraninae*, nous paraissent aujourd'hui mieux placés dans celle des *Cteninae* et même que certains de leurs genres, tels que *Argoctenus* et *Vulsor*, doivent passer dans le groupe des *Calocteneae*.

La sous-famille des *Cteninae*, ainsi modifiée, comprendra les groupes *Cteneae*, *Acantheae*, *Calocteneae* (y compris *Argoctenus* et *Vulsor*), *Miturgeae* et *Zoreae*; celle des *Liocraninae* sera réduite aux groupes *Liocraneae* et *Phrurolitheae* (*Micariosomateae*).

La famille des *Agelenidae* est représentée par le vulgaire *Nicodamus bicolor* L. KOCH, si abondamment répandu dans toute l'Australie et par un *Desis* surtout voisin de *D. marina* HECTOR, de N. Zélande, il a été observé dans la baie d'Albany.

Celle des *Pisauridae* est réduite au *Dolomedes facetus* L. KOCH, très largement distribué dans toute l'Australie et même la Nouvelle-Zélande; celle des *Lycosidae* est beaucoup plus nombreuse, à part l'espèce dominante, *L. Leuckarti* THORELL, aussi indiquée du Queensland, les espèces nous ont paru toutes différentes de celles de l'Australie orientale et comme représentatives; l'une d'elles *L. miracula* E. S., offre le caractère exceptionnel d'avoir quatre dents à la marge inférieure des chélicères, mais il faut dire que le Dr. L. KOCH ne parle pas de l'armature des chélicères pour les nombreuses espèces qu'il décrit, cependant avec beaucoup de soin.

Parmi les *Salticidae* les uns sont largement distribués dans toute l'Australie: *Breda jovialis*, *Holoplatys planissima*, *Ocrisiona leucocomis* L. KOCH etc.; d'autres appartiennent à des genres exclusivement australiens: *Astia*, *Helpis*, *Clynotis*, *Servaea* etc.; d'autres à des genres répandus dans le monde entier: *Saitis*, *Habrocestum*, mais ceux-ci sont en général peu caractérisés, et deviendront peut-être, quand ils seront mieux connus, les types de genres spéciaux; nous n'en décrivons qu'un seul *Adoxotoma*, qui nous paraît faire le passage du groupe des *Astia* à celui des *Rogmocrypta*.

## Fam. Drassidae.

(Pars 1, p. 381.)

### Subfam. Hemicloeninae.

(Adjectio p. 381.)

#### *Trachytrema* nov. gen.

A *Trachycosmo*, cui valde affine est (cephalothorace, sterno, chelis unguibusque pedum similibus) area oculorum quatuor mediorum saltem duplo latiore quam longiore et postice quam antice multo latiore, oculis mediis posticis parvis et rotundis (in *Trachycosmo* area vix latiore quam longiore et parallela, oculis mediis posticis inter se appropinquantis et subangulosis), pedibus multo longioribus, tibiis metatarsisque 4i parvis subtus aculeis debilibus uniseriatis armatis, distinguendum.

*Trachytrema castaneum* n. sp.

♀. Long. 6 mm. Cephalothorax sat longus, fere parallelus, superne deplanatus, subtilissime coriaceus, fusco-castaneus, tenuissime nigro-cinctus. Oculi antici in lineam levissime procurvam, medii vix majores, rotundi, a lateralibus quam inter se saltem  $\frac{1}{3}$  remotiores, laterales ovati, ad marginem clypei siti. Oculi postici anticis minores, aequi, medii a lateralibus quam inter se evidenter remotiores, sed spatio oculo fere quadruplo latiore a sese distantes. Area mediorum plus duplo latior quam longior et postice quam antice multo latior. Abdomen longe oblongum, depressiusculum, nigricanti-cinereum, subтус, praesertim antice, paulo dilutius. Chelae fusco-rufulae, laeves et nitidae, convexae et geniculatae, margine inferiore sulci dentibus parvis binis, inter se latissime separatis armato et inter dentes pilis crassis fimbriato. Sternum pedesque fulvo-rufula, laevia, pedes versus extremitates paulo obscuriores, tibiis 4i paris subtus aculeis debilibus, sed in granulis minutissimis insertis, quinque uniseriatis munitis, metatarsis aculeis longioribus et tenuibus duobus, apicali minore, instructis. Plaga genitalis fulva, leviter depressa, plus duplo longior quam latior, postice sulco abbreviato, crasse testaceo-marginato, divisa.

Stat. 76, Day Dawn.

## Fam. Clubionidae.

## Subfam. Selenopinae.

Gen. *Selenops*.*Selenops australiensis* L. Koch.

Arachn. Austr., I, p. 615, tab. XLVIII, fig. 6. — Ibid. p. 832, tab. LXXI, fig. 3.

Stat. 154, Pickering Brook.

Femina unica pulla. In Australia orientali occurrit etiam haec species (sec. L. KOCH).

## Subfam. Molycrieae.

(Adjectio p. 442.)

*Cerygerda* nov. gen.

A *Molyeria* et *Myandra* differt mamillis cunctis apicalibus, brevibus, aequis et subcontiguis, clypeo latiore et leviter proclivi, sterno magno, leviter convexo, longius ovato. — A *Sphingio* cephalothorace humiliore, abdomine haud scutato, chelis debilioribus, nec convexis nec geniculatis, oculis fere ut in *Molyeria* ordinatis, quatuor posticis inter se valde appropinquatis, in lineam valde procurvam, mediis longis multo majoribus, mediis anticis lateralibus majoribus, lateralibus utrinque contiguis, abunde differt.

*Cerygerda cursitans* n. sp.

♀. Long. 3 mm (pullus). Cephalothorax sat longe ovatus, humilis, laevis, fusco-nigricans, vitta latissima albido-testacea, oculos posticos attingente, in parte thoracica leviter dentata, notatus, regione oculorum et clypei intense nigra. Clypeus leviter proclivis, area oculorum paulo angustior. Oculi antichi in lineam parvam, modice procurvam, inter se subcontigui, medii rotundi nigri lateralibus, albis et ovatis, saltem duplo majores. Oculi postici in lineam valde procurvam, inter se subcontigui, medii longi et transversi, lateralibus fere triplo majores. Oculi medii aream latiore quam longiore et subparallelam occupantes. Oculi laterales utrinque parvi, aequi et contigui. Abdomen longum, fere parallelum, antice posticeque obtuse truncatum, albido-testaceum, superne utrinque vitta nigra lata, intus obtuse sinuoso-dentata, marginatum. Mamillae parvae, aequae et confertae, albae, inferiores superne nigro-lineatae. Sternum laeve et nitidum, pallide fulvo-testaceum, marginem versus leviter umbrosum. Chelae sat angustae, nigro-olivaceae, nitidae. Pedes quatuor antichi longi, robusti, sed metatarsis tarsisque gracilibus, pedes 3i paris multo breviores (pedes 4i paris carentes), albo-testacei, subpellucetes, femoribus quatuor anticis fere usque ad basin, femore 3i paris ad apicem, tibiis cunctis ad basin nigro-olivaceis. Pedes-maxillares albo-testacei, femore ad apicem, tibia ad basin minutissime nigro-notatis.

Stat. 76, Day Dawn.

## Subfam. Clubioninae.

Gen. *Clubiona*.

## Conspectus specierum Australiae occidentalis.

1. Tibiae 3i paris subtus uniaculeatae. Abdomen concolor, superne cinereo-rufescens, antice leviter et confuse dilutius . . . *C. laudabilis* n. sp.  
Tibiae 3i paris subtus biaculeatae. Abdomen supra lineatum vel maculatum . . . . . 2
2. Abdomen subtus, in regione epigastri, maculis nigris binis incurvis, in regione ventrali vittis binis fuscis latis, ornatum. Chelae maris angustae, longissimae et proclives . . . . . *C. cycladata* n. sp.  
Abdomen subtus albido-testaceum concolor . . . . . 3
3. Abdomen supra maculis mediis parvis seriatis, utrinque maculis majoribus longis et obliquis seriatis fusco-rufulis decoratum. Tibiae quatuor anticae subtus ad marginem anteriorem biaculeatae. Magnitudo media.

*C. robusta* L. KOCH

Abdomen supra flavidum, utrinque late rufulo-marginatum et linea media exili et integra rufula sectum. Tibiae quatuor anticae subtus uniaculeatae . . . . . *C. munis* n. sp.

***Clubiona robusta* L. Koch.**

Ar. Austr., I, 1873, p. 417, tab. XXXIII, fig. 2—3.

♂. Long. 5 mm. Cephalothorax fulvo-rufescens, saepe antice paulo obscurior, laevis et nitidus, albo-sericeo-pubescent. Oculi medii antici nigri et rotundi, lateralibus ovatis paulo majores et a lateralibus quam inter se plus minus remotiores. Oculi postici parvi, aequi, medii inter se quam a lateralibus remotiores. Abdomen oblongum, pallide luteo-testaceum, supra antice vitta longitudinali fusco-rufula abbreviata et truncata, dein maculis parvis nigricantibus 5 vel 6, crebre uniseriatis et apicem versus sensim minoribus, anticis subquadratis posticis acute triquetris, utrinque in lateribus maculis longis et obliquis 5 vel 6, interdum parvis, interdum latis et vittiformibus ornatum, subtus concolor. Chelae fulvo-rufulae, laeves, parce nigro-crinitae, verticales, validae et convexae, haud angulosae, margine inferiore sulci dentibus parvis binis, 2<sup>o</sup> paulo majore, armato. Partes oris leviter infuscae, laminae extus ad apicem dilatato-rotundae. Sternum pedesque luteo-testacea. Pedes aculeis longis ordinariis armati, tibia 3<sup>i</sup> paris subtus biaculeata. Pedes-maxillares lutei tarso infuscato, femore supra 1—3-aculeato, patella paulo longiore quam latiore, apicem versus leviter ampliata, tibia patella brevior, haud vel vix latiore quam longiore, apophysi nigra simplici, articulo saltem haud brevior, leviter oblique divaricata, ad basin robusta et superne leviter angulosa, ad apicem compressa attenuata sed obtusa atque incurva, tarso longe cylindraceo, bulbo longe ovato, apicem tarsi fere attingente, longitudinaliter sulcato, apice truncato cum angulo interiore producto et incurvo.

♀. Long. 5,5 mm. Mari subsimilis. Cephalothorax antice plerumque sensim infuscatus et rufescenti-tinctus. Chelae et partes oris rufo-castaneae. Pedes breviores, lutei, tarsis metatarsisque anticis paulo obscurioribus, tibiis anticis subtus, ad marginem interiorem, aculeis longis binis instructis. Area genitalis antice subtiliter transversim striata, dein plagula rufula, tenuiter nigro-marginata, circiter aequae longa ac lata, antice truncata et depressa, postice sensim attenuata et rotunda, leviter convexa et foveola subrotunda et marginata, impressa.

Stat. 67, Dirk Hartog, Brown Station; Stat. 93, Kalgoorlie; Stat. 94, Coolgardie; Stat. 95, Boorabbin; Stat. 109, Subiaco N.; Stat. 137, Collie; Stat. 146, Boyanup; Stat. 162, Torbay; Stat. 165, Albany.





Secundum L. KOCH in Australia occidentali (Swan-River) inventa est haec species.

*Clubiona cycladata* n. sp.

♂. Long. 5 mm. Cephalothorax pallide fulvo-rufescens, laevis et nitidus, albo-sericeo-pubescens. Oculi antici inter se aequae et sat anguste separati, medii nigri et rotundi lateralibus ovatis evidenter majores. Oculi postici sat parvi, aequi, medii inter se quam a lateralibus remotiores. Abdomen angustum et longum, albido-testaceum, supra, in dimidio basali, lineolis binis postice convergentibus saepe obsoletis fusco-rufulis notatum, in lateribus et postice tenuiter et crebre fusco-rufulo-striatum, subtus regione epigastri maculis nigris binis valde incurvis, regione ventrali vittis binis fusco-rufulis, latis et postice sensim convergentibus, ornatum. Chelae fulvo-rufulae, laeves, antice setis nigris validis et longis conspersae, longae et proclives, angustae et cylindraceae, haud angulosae, margine inferiore sulci mutico et tenuissime carinato, superiore dentibus binis remotissimis armato, ungue fusco longissimo, in dimidio basali sat robusto et leviter curvato, in dimidio altero abrupte angustiore et acutissimo. Partes oris, sternum pedesque pallide lutea, pars labialis sternumque ad marginem leviter infusca, laminae longissimae, divaricatae et angustae, fere parallelae atque obtusae. Pedes aculeis tenuibus ordinariis armati, tibia 3<sup>i</sup> paris subtus biaculeata. Pedes-maxillares longi, pallide lutei, tarso infusato et rufulo, bulbo fere nigro, femore supra 1—3-aculeato, patella cylindracea saltem triplo longiore quam latiore, tibia patella saltem  $\frac{1}{3}$  brevior, subtus longe crinita, apophysi nigra simplici, robusta et attenuata sed obtusa, apice incurva, extus ad apicem armata, tarso angusto et longo, fere cylindraceo, bulbo longe ovato, simplici, apicem tarsi fere attingente.

♀. Long. 5,5 mm. Mari subsimilis sed chelis brevioribus et subverticalibus, laminis paulo brevioribus, extus ad apicem leviter dilatato-rotundis. — Tibiae quatuor anticae subtus, ad marginem interiorem, aculeis longis binis instructae. Plaga genitalis circiter aequae longa ac lata, antice leviter emarginata, fusco-rufula, rugoso-striata et crasse albo-crinita, postice rotunda, depressa et margine nigro discreta.

Stat. 103, Guildford; Stat. 137, Collie; Stat. 162, Torbay.

*Clubiona munis* n. sp.

♀. Long. 3 mm. Cephalothorax fulvo-rufescens, antice leviter et sensim infuscatus, fronte, pone oculos medios anticos, minute nigricanti-notata, laevis, albo-sericeo-pilosus. Oculi antici fere aequae et anguste separati, medii nigri et rotundi lateralibus ovatis saltem  $\frac{1}{3}$  majores. Oculi postici aequi, medii inter se quam a lateralibus saltem  $\frac{1}{3}$  remotiores. Abdomen

oblongum, supra pallide flavidum, utrinque late fusco-rufulo-marginatum et linea media fusco-rufula, leviter dentata et postice acuminata, sectum, subtus omnino albido-testaceum. Chelae validae et convexae, rufulae, sublaeves, parce nigro-crinitae, margine inferiore sulci bidentato. Partes oris fuscae. Sternum pedesque pallide lutea, metatarsis tarsisque anticis paulo obscurioribus et olivaceis, tibia 1<sup>i</sup> paris aculeo inferiore tenui et longo submedio, tibia 2<sup>i</sup> paris aculeo simili subbasilari armatis, pedes postici sat numerose aculeati, tibia 3<sup>i</sup> paris subtus aculeis binis uniseriatis, 1<sup>o</sup> basali altero multo minore, munita. Plaga genitalis fulva, antice linea transversa subrecta fusca discreta, postice foveola parva subrotunda impressa.

Stat. 76, Day Dawn.

*Clubiona laudabilis* n. sp.

♀. Long. 3,5 mm. Cephalothorax flavido-lutescens, antice leviter et sensim rufescenti-tinctus, fronte, pone oculos medios anticos, minute nigricanti-notata, laevis, albo-sericeo-pilosus. Oculi antici inter se anguste et fere aequae separati, medii nigri et rotundi lateralibus ovatis fere duplo majores. Oculi postici aequi, medii inter se quam a lateralibus saltem  $\frac{1}{3}$  remotiores. Abdomen longe oblongum, supra cinereo-rufescens, antice dilutius et albidum, subtus omnino albido-testaceum, albo-sericeo-pubescent. Chelae validae et convexae, rufulae, sublaeves et parce nigro-crinitae, margine inferiore sulci dentibus binis subaequis armato. Partes oris obscure fulvo-rufulae. Sternum pedesque pallide lutea, metatarsis tarsisque anticis olivaceis muticis subtus usque ad basin crebre cinereo-setosis, pedes postici sat numerose aculeati sed tibia 3<sup>i</sup> paris subtus aculeo unico submedio munita. Plaga genitalis sat parva, latior quam longior, rufula, antice maculis fuscis binis rotundis subgeminatis et leviter depressis notata.

Stat. 65, Denham.

Gen. *Chiracanthium*.

*Chiracanthium nerrosus* n. sp.

♀. Long. 8 mm. Cephalothorax convexus, fulvo-rufulus, albo-sericeo-pilosus, oculis mediis in maculam parvam nigram transversam sitis. Oculi medii antici et postici a lateralibus quam inter se remotiores, aream circiter aequae longam ac latam et antice quam postice angustiore occupantes, antici nigri postici fere  $\frac{1}{3}$  majores et majores quam laterales antici. Abdomen oblongum, fulvo-testaceum concolor. Chelae validae, nitidae, rufulae, apice minute nigrae. Partes oris fulvo-rufulae. Sternum, pedes-maxillares pedesque lutea, pedes sat longe pilosi, minute et parcellissime aculeati. Regio epigastri leviter convexa, fulva, fovea testacea parva, simplici, antice truncata, postice attenuata, impressa.

Stat. 115, North Fremantle.

A *C. brevicealcarato* L. KOCH, cui verisimiliter affine est, differt cephalothorace haud impresso, oculis mediis anticis majoribus, fovea genitali simpliciore etc.

*Chiracanthium pennuliferum* n. sp.

♂. Long. 6 mm. Cephalothorax laevis, fulvus, parte cephalica vitta media et utrinque vitta obliqua fusco-olivaceis, antice evanescentibus, notata, regione frontali, pone oculos medios anticos, minute fusco-notata. Oculi parvi, cuncti subaequales, antici in lineam rectam, medii a lateralibus quam inter se vix remotiores, postici in lineam leviter procurvam, quatuor medii aream parallelam paulo latiore quam longiorem occupantes. Abdomen oblongum, cinereo-testaceum, crebre albido-atomarium, supra vitta media integra fusco-rufula, antice acuminata, postice leviter dentata, ornatum. Chelae luteae, nitidae, haud angulosae, longae et attenuatae, ungue longo rufulo. Partes oris, sternum pedesque pallide lutea, parte labiali patellisque paulo obscurioribus, femoribus tibiisque ad apicem leviter infuscatis et subannulatis. Pedes antici posticis multo longiores, cuncti aculeis debilibus paucis armati. Pedes-maxillares pallide lutei, femore ad apicem patellaque leviter infuscatis, femore gracili, superne, in dimidio apicali, seta spiniformi longa munito, patella sat brevi, tibia patella saltem  $\frac{1}{3}$  longiore, gracili et leviter curvata, subtus longe setosa, superne in dimidio apicali setis curvatis uniseriatis, apicem versus sensim longioribus, ornata, apophysi fulva, gracili acuta et subrecta, antice directa, extus ad apicem armata, tarso sat magno, late ovato et depressiusculo, apophysi basali retro-directa, longissima, dimidium femoris fere attingente, nec carinata nec dentata, leviter arcuata sed ad apicem setiformi et paululum deorsum curvata, bulbo plano, ovato, apice oblique truncato, extus stylo libero tenui circumdato.

Stat. 109, Subiaco N.; Stat. 165, Albany.

A *C. gracili* L. KOCH, ex Australia orient., cephalothorace trilineato, abdomine rubro-vittato, pedibus subannulatis minus aculeatis, apophysi tarsi deorsum (haud sursum) curvata etc. abunde differt.

**Nota:** *Chiracanthium brevicealcaratum* L. KOCH, species mihi ignota, ad Swan-River inventa est.

## Subfam. Cteninae.

### Calocteneae.

#### Gen. *Argoctenus* L. Koch.

Ar. Austr., 1878, p. 990 (non *Argoctenus* E. SIMON, Hist. nat. Ar., II, p. 132).

Clypeus area oculorum mediorum haud vel non multo angustior. Oculi parvi (laterales antici) ser. 2<sup>ae</sup>, ab oculis mediis anticis et posticis fere

aequidistantes. Chelarum margo inferior dentibus binis aequis et subcontiguus et saepe dente tertio minutissimo et remoto armatus. Tibiae anticae aculeis tenuibus haud prominulis inferioribus 3-3 vel rarius 2-2 aculeoque laterali parvo interiore armatae, metatarsi antici graciles sed usque ad basin scopulati, aculeis subbasilaribus longissimis binis tantum muniti. Pedes postici numerosissime aculeati.

**Nota:** Hoc genus, lucusque mihi ignotum, a *Calocteno* quam a *Miturga* magis affine est et a gen. *Miturgina* E. SIMON (*Argocteno* E. SIM., H. nat. Ar., II, p. 132, non L. KOCH) diversum est.

Gen. *Caloctenus* ab *Argocteno* oculis parvis lateralibus anticis a mediis anticis quam a posticis remotioribus, chelarum margine inferiore quadridentato, tibiis anticis aculeis validis et longis, prominulis et numerose biseriatis, subtus munitis, differt.

Gen. *Miturgina* E. SIMON (in Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 211) valde ambiguum est et inter *Caloctenum* et *Miturgam* transitum fere formans, ab *Argocteno* differt clypeo area oculorum mediorum multo angustiore, oculis parvis ser. 2<sup>ae</sup> (lateralibus anticis) a mediis posticis quam ab anticis remotioribus, chelarum margine inferiore bidentato.

### *Argoctenus nebulosus* n. sp.

♀. Long. 9 mm. Cephalothorax fusco-castaneus, regione oculorum nigra, crebre fulvo-cervino-pubescent, utrinque vitta lata et leviter sinuosa albido-flavescente-pilosa cinctus, facie nigra breviter et parce rubro-pilosa, utrinque vitta obliqua alba marginata et maculam trapeziformem designante. Oculi quatuor postici in lineam validissime recurvam, aequi, medii a lateralibus quam inter se plus duplo remotiores. Oculi quatuor medii aream paulo longiorem quam latiore et antice quam postice paulo angustiore occupantes, antici posticis evidenter minores. Oculi laterales antici, parvi et ovati, a mediis anticis et posticis fere aequae remoti. Clypeus verticalis planus, area oculorum mediorum circiter aequilatus. Abdomen breviter ovatum, postice ampliatus, supra obscure fulvo-lividum, vitta media lata et confusa nigricanti notatum, sed omnino crebre fulvo-cervino-pubescent, subtus paulo dilutius et albo-pilosum. Sternum nigrum, crebre albo-pilosum. Partes oris fuscae, pars labialis paulo latior quam longior et dimidium laminarum haud attingens. Chelae sat longae, nitidae, fusco-rufulae, ad basin nigricantes et albo-pilosae, margine inferiore sulci longe obliquo, dentibus trinis, 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> inter se appropinquatis, ultimo minore remoto. Pedes longi, metatarsis tarsisque tenuibus, anticis usque ad basin sat crebre scopulatis, quatuor antici fulvo-rufuli, metatarsis tarsisque infuscatis, femoribus tibiisque intus vix distincte cinereo-lineatis, postici nigricantes, patellis tibiis metatarsisque (saltem ad basin) superne fulvo-vittatis,

cuncti albo-pilosi. Pedes-maxillares fulvi, femore patella tibiaque nigro-maculatis. Fovea genitalis longior quam latior, postice parallela, anguste nigro-marginata et plagulam liguliformem fuscam et laevem includente. antice leviter ampliata et obtusissime triquetra.

Stat. 160, Cranbrook.

Ab *A. picto* L. KOCH (ex King Georges Sund) differt imprimis pictura cephalothoracis abdominisque, femoribus posticis nigris haud annulatis etc.

*Argoctenus hystriculus* n. sp.

♀. Long. 6 mm. Cephalothorax niger, parcissime albo-pilosus, parte cephalica vitta media latissima sed postice attenuata paulo dilutiore et ferruginea crebre flavido-aurantiaco-pilosa et albo-marginata, thoracica utrinque maculis submarginalibus valde laciniosis obscure fulvis et albo-pilosis, ornatis. Oculi medii inter se subaequales (antici posticis vix minores) aream subquadratam, vix longiorem quam latiore, occupantes. Clypeus area mediorum paulo angustior. Abdomen supra nigrum, obscure cervino-pubescent, nigro-hirsutum subspinosum, maculis parvis punctisque niveis (ex pilis crassis depressis et obtusis) inordinate conspersum, subtus paulo dilutius, cinereo-cervino-pilosum. Chelae antice nigro-nitidae, ad basin pilis niveis crassis et obtusis ornatae, praeterea subglabrae, subtus rufulae, margine inferiore dentibus binis aequis et subcontiguis tantum armato. Partes oris fusco-castaneae. Sternum fulvo-rufulum, granulis parvis albescentibus, praesertim ad marginem, conspersum. Pedes nigricantes, femoribus supra fulvo-plagiatis et subannulatis, coxis tarsisque cunctis obscure fulvo-rufulis, metatarsis 4i paris annulo medio fulvo cinctis, tibiis anticis subtus aculeis tenuibus 2—2 tantum armatis. Pedes-maxillares lutei nigro-plagiati, tarso fusco. Plaga genitalis parva, rufula, longior quam latior, sulco vel carinula, tenui et depressa, longitudinaliter secta.

Stat. 123, Cannington.

*Elassoctenus* nov. gen.

Cephalothorax ovatus, antice haud acclivis, parte thoracica leviter convexa, utrinque impressa et sulco medio lato divisa. Oculi postici in lineam validissime recurvam, medii a lateralibus quam inter se saltem triplo remotiores. Area oculorum mediorum obliqua, subquadrata, medii antici posticis paulo minores, utrinque oculus parvus anticus a medio postico atque a medio antico fere aequae remotus. Clypeus subverticalis area oculorum mediorum paulo angustior. Chelarum margo inferior dentibus parvis binis, inter se remotis, armatus. Laminae leviter divaricatae. Pars labialis obtusa, paulo latior quam longior et dimidium laminarum haud attingens. Sternum late cordiforme, saltem haud longius quam latius sed postice

breviter acuminatum. Pedes antici robusti, tibiis metatarsisque aculeis validis et longis singulariter elevatis, numerosis (in tibiis saltem 6—6 vel 7—7) et biseriatis, subtus armatis, pedes postici fere mutici, anticis multo longiores et graciliores.

A *Calocteno* imprimis differt area oculorum mediorum subquadrata, laminis-maxillaribus divaricatis, pedibus anticis robustioribus et brevioribus, pedibus posticis fere muticis, chelarum margine inferiore tantum bidentato.

***Elassoctenus harpax* n. sp.**

♀. Long. 4 mm. Cephalothorax fusco-castaneus, antice fere niger, pilis fulvis curvatis sat brevibus conspersus, utrinque vitta lata longius sed parce albido-pilosa marginatus. Abdomen breviter ovatum, interdum fulvo-testaceum utrinque, in declivitate, late infuscatum, interdum superne nigrinum et breviter fulvo-pilosum, subtus dilutius et albo-pubescent. Chelae longae, fusco-olivaceae, nitidae. Partes oris obscure fuscae, ad marginem dilutiores. Sternum nitidum, olivaceum, in medio paulo dilutius, parce albo-pilosum. Pedes antici robusti, obscure fulvo-olivacei, femoribus 1<sup>i</sup> paris intus, in dimidio apicali, aculeis robustis longis et singulariter elevatis 2 vel 3, tibiis aculeis similibus 7—7 (apicalibus minoribus), metatarsis aculeis longis 2—2 apicalibusque parvis 2—2, subtus armatis, pedes postici multo longiores et graciliores, femoribus nigris, reliquis articulis 4<sup>i</sup> paris flavidis, tibiis aculeo parvo apicali, metatarsis aculeis parvis 2 vel 3 tantum munitis. Pedes-maxillares fulvi, nigro-variegati et subannulati. Area genitalis fusca, vix convexa, sed in medio leviter depressa, antice foveola testacea angulosa, subquadrata vel latiore quam longiore, impressa.

Stat. 75, Geraldton; Stat. 98, Wooreloo; Stat. 99, Lion Mill.

***Hestimodema* nov. gen.**

Cephalothorax fere ut in praecedenti sed parte cephalica antice leviter declivi. Oculi postici magni, aequi, in lineam validissime recurvam, medii a lateralibus quam inter se remotiores, sed a lateralibus spatio oculo angustiore distantes. Oculi antici in lineam leviter recurvam, laterales ovati mediis vix  $\frac{1}{4}$  minores, a mediis anticis subcontigui a posticis bene distincti. Oculi quatuor medii aream compactilem subquadrata, vel antice quam postice angustiore, occupantes, antici posticis minores. Clypeus verticalis, oculis mediis anticis haud vel non multo latior. Chelae validae, margine inferiore sulci dentibus binis aequis et acutis, inter se distantibus, armato. Laminae sat breves, rectae et obtusae. Pars labialis multo latior quam longior et dimidium laminarum haud attingens. Sternum late cordiforme sed postice breviter acuminatum. Pedes fere ut in praecedenti, antici posticis robustiores, tibiis metatarsisque aculeis validis longissimis



et singulariter elevatis subtus instructis sed aculeis apicalibus carentibus, pedes postici numerosius aculeati, pedes 4i paris graciles et longissimi, tarsi cuncti tenues, haud scopulati, sub unguibus fasciculis parvis setarum simplicium muniti. Ungues graciles, dentibus 5 vel 6, sat longis, sed versus basin sensim minoribus, armati.

A gen. *Odo*, cui sat affinis est, differt oculis quatuor anticis inter se minus iniquis et lineam minus recurvam designantibus, pedibus anticis multo brevioribus et validioribus quam pedibus 4i paris, tibiis metatarsisque aculeis inferioribus biseriatis validioribus et singulariter prominulis, subtus instructis.

*Hestimodema ambigua* n. sp.

♂. Long. 5 mm. Cephalothorax laevis, obscure fulvo-olivaceus, regione oculorum nigra, parte thoracica utrinque late et confuse radiatim umbrosa sed postice linea media tenui dilutiore notata, parce albido-pilosus. Oculi medii aream subquadratam, antice quam postice vix angustiore occupantes. Clypeus oculis mediis anticis haud latior. Abdomen breviter ovatum, supra obscure fulvo-olivaceum, praesertim postice grosse et sat crebre nigro-punctatum, in dimidio basali vitta longitudinali fusco-rubra, tenuiter et sinuose nigro-marginata, in dimidio apicali maculis nigris angulosis, iniquis et laciniosis, biseriatis notatum, subtus dilutius et parcius nigricanti-punctatum, sed parce albido-pilosum. Chelae nitidae, antice fulvo-olivaceae, leviter et confuse fusco-reticulatae. Partes oris sternumque fulvo-olivaceae, pars labialis obscurior, sternum nitidum, parce albo-pilosum. Pedes pallide fulvo-olivacei, quatuor antici paulo obscuriores, femoribus anticis aculeis interioribus binis dorsalibusque longis et subtus setis validis seriatis 4 vel 5 armatis, tibiis aculeis inferioribus longissimis, singulariter elevatis 3—3, metatarsis aculeis inferioribus similibus 2—2 et utrinque lateralibus binis multo minoribus, munitis. Pedes 4i paris reliquis multo longiores, numerose aculeati, coxis intus setis validis nigris penicillatis. Pedes-maxillares fulvo-olivacei, tarso bulboque fuscis, femore robusto, supra aculeo valido, submedio aculeisque apicalibus minoribus munito, patella longiore quam latiore, levissime ovata, intus prope basin seta spiniformi munita, tibia patella vix brevior, extus ad apicem apophysi longa, in parte basali fulva crassa et parallela, in parte apicali nigra, abrupte angustiore et extus curvata, instructa, tarso late ovato et convexo, apice breviter acuminato, bulbo magno et convexo, complicato, ad basin stylo valido circumdato, ad apicem apophysi gracili angulose-curvata, munito.

♀. Long. 5,2 mm. Mari subsimilis sed coxis posticis haud penicillatis. Pedes-maxillares fulvo-olivacei, tibia tarsoque infuscatis. Plaga genitalis

rufula, plana, subquadrata, antice areis binis angulosis, leviter depressis et tenuissime nigro-marginatis, notata.

Stat. 99, Lion Mill; Stat. 123, Cannington.

*Hestimodema latevittata* n. sp.

♀. Long. 5 mm. Cephalothorax niger, vitta media integra sat angusta et utrinque vitta marginali latiore, sed prope medium minute fusco-binotata, pallide flavidis et albo-pilosis ornatus. Area oculorum mediorum antice quam postice evidenter angustior. Clypeus oculis mediis anticis saltem  $\frac{1}{3}$  lator. Abdomen supra nigrinum, pilis plumosis cinereo-olivaceis vestitum et maculis quatuor, posticis majoribus, ex pilis depresso-lanceolatis decoratum, subtus paulo dilutius, nigricanti-marmoratum et albido-pilosum. Partes oris nigro-olivaceae. Sternum nitidum, fulvum, utrinque sinuose nigro-marginatum. Chelae antice nigro-olivaceae, intus atque ad apicem dilutiores et fulvo-rufulae. Pedes fulvi, versus extremitates obscuriores et rufulo-tincti, femoribus, saltem subtus, late nigro-triannulatis, tibiis anticis nigro-annulatis, femoribus anticis aculeis dorsalibus binis longissimis et intus aculeis subapicalibus minoribus binis munitis, subtus non seriatim setosis, tibiis anticis subtus aculeis validis et longissimis 2—2 singulariter elevatis, metatarsis aculeis similibus 2—2 subtus armatis. Plaga genitalis simplex, magna, lator quam longior, antice rotunda, postice recte secta, leviter depressa, nigra vel fusco-rufula, coriacea.

Stat. 118, Fremantle, coemeterio; Stat. 145, Donnybrook.

**Nota:** Species gen. *Odo* adhuc in America tantum inventae sunt, *O. guttipes* E. SIM., ex Tasmania, a reliquis sp. americanis satis discrepat et melius typus gen. proprii erit.

*Odomasta* nov. gen. (*Odo* E. SIM. ad part.). — A gen. *Odo* differt oculis posticis minoribus in lineam validissime recurvam, mediis a lateralibus quam inter se multo remotioribus sed spatio oculo latiore a sese distantibus (in gen. *Odo* oculis posticis maximis in lineam modice recurvam inter se fere aequae et sat anguste separatis, spatiis interocularibus oculis multo minoribus), metatarsis anticis haud scopulatis, aculeis inferioribus tenuibus 2—2 aculeisque lateralibus armatis (in gen. *Odo* leviter scopulatis et aculeis subbasilaribus binis longissimis tantum armatis) — typus: *Odo guttipes* E. SIM., ex Tasmania.

**Zoreae.**

**Gen. *Ctenomma* Thorell.**

*Ctenophthalmus* E. SIMON, in Ann. Soc. ent. Belg., C. R. nov. 1890 (praeocc.). — *Simonius* RITSEMA, in Tijdschr. v. Ent., XXIV, 1881, p. CXI (praeocc.). — *Ctenomma* THORELL, St. Rag. Mal. etc., IV, 1890, p. 131; E. SIMON, Hist. nat. Ar., II, p. 136.



*Ctenomma lineatum* (E. Simon).*Ctenophthalmus lineatus* E. S., in Ann. Soc. ent. Belg., C. R., 1890.

♂. Long. 3,5 mm. A femina differt pedibus longioribus et gracilioribus. Pedes-maxillares sat breves et robusti, albidi valde nigro-maculati, tarso bulboque fulvo-rufulis, femore subrecto supra, in dimidio apicali, aculeo medio aculeisque lateralibus munito, patella tibiaque setis spiniformibus paucis munitis, patella evidenter longiore quam latiore, tibia patella circiter aequilonga, levissime curvata, extus apophysi apicali antice directa, fusca, valde compressa et laminiformi, apice truncata cum angulo inferiore valde ampliato, profunde et fere aequaliter fissio et bidentato, tarso ovato, convexo, apice acuminato, bulbo sat convexo.

Stat. 98, Wooroloo.

Haec species quoque in ins. Nova-Caledonia vitam degit, ad Noumeam inventa.

**Miturgeae.****Gen. *Miturga*.****Conspectus specierum Australiae occidentalis.**

1. Cephalothorax linea marginali nigra vel fusca cinctus . . . . . 2  
Cephalothorax maculis marginalibus notatus . . . . . 4
2. Tibiae posticae aculeis dorsalibus carentes . . . . . *M. agelenina* n. sp.  
Tibiae posticae aculeis dorsalibus binis munitae . . . . . 3
3. Abdomen subtus fulvum et albido-pilosum. Clypeus oculis anticis plus  
duplo latior . . . . . *M. occidentalis* n. sp.  
Abdomen subtus infuscatum et testaceo-quadrilineatum. Clypeus oculis  
anticis haud duplo latior . . . . . *M. severa* n. sp.
4. Abdomen subtus fulvum. Oculi medii antici lateralibus haud vel vix  
minores . . . . . *M. ferina* n. sp.  
Abdomen subtus nigrum vel obscure olivaceum, lineolis quatuor testaceis  
albisve notatum . . . . . 5
5. Oculi medii antici lateralibus paulo majores et paulo majores quam  
medii postici — ♂ tibia pedum-maxillarium apophysi apicali mucroni-  
busque binis extus instructa . . . . . *M. Thorelli* n. sp.  
Oculi medii antici plerumque minores (saltem haud majores) quam late-  
rales antici et medii postici . . . . . 6
6. Tibiae quatuor anticae aculeis inferioribus 3—3 munitae, sed aculeis  
lateralibus carentes . . . . . *M. Whistleri* n. sp.  
Tibiae quatuor anticae aculeis inferioribus 3—3 et tibiae 2i parvis aculeo  
lateralis interiore vel lateralibus binis munitae . . . . . 7

7. Tibiae 2<sup>i</sup> paris aculeo laterali interiore, in dimidio apicali sito, armatae. Femora supra late et confuse fusco-plagiata . . *M. impedita* n. sp.  
Tibiae 2<sup>i</sup> paris aculeis lateralibus interioribus binis armatae. Femora supra infuscata atque ad radicem aculeorum albo-punctata.

*M. catographa* n. sp.

***Miturga occidentalis* n. sp.**

♀. Long. 15—18 mm. Cephalothorax ovatus, obscure fuscus, parte cephalica antice sensim nigra, vitta media latissima, sed postice attenuata et utrinque vitta submarginali angustiore sinuoso-dentata, fulvo-rufulis et crebre albido-cinereo-pilosis ornatus. Oculi antiqui inter se subaequales (medii vix majores) et aequidistantes, in lineam levissime procurvam. Oculi postici in lineam leviter recurvam, aequi, medii a lateralibus quam inter se saltem  $\frac{1}{3}$  remotiores. Oculi quatuor medii aream circiter aequae longam ac latam et antice quam postice vix angustiore occupantes, antiqui posticis vix majores. Clypeus oculis mediis anticis plus duplo latior. Abdomen oblongum, fulvum, supra, in dimidio basali, lineolis tenuissimis inter se appropinquatis et postice convergentibus, vittam angustam lanceolatam designantibus et utrinque vitta latiore leviter incurva, in dimidio altero lineolis quatuor, punctatis, vix expressis, fuscis notatum, supra omnino crebre fulvo-cervino-, subtus fulvo-albido-pubescent. Chelae robustae et convexae, nigrae, sublaeves, albido-cinereo-pilosae et nigro-hirsutae, margine superiore sulci dentibus contiguis trinis, medio majore, inferiore dentibus validis binis aequis, instructis. Partes oris intense nigrae. Sternum obscure fusco-castaneum, postice leviter et confuse dilutius, cinereo-pilosum et nigro-crinitum. Pedes robusti, fulvo-rufuli, metatarsis tarsisque cunctis tibiisque anticis ad apicem infuscatis, crebre albido-cinereo-pilosi, tibiis quatuor anticis aculeis inferioribus mediocribus 3—3, tibia 1<sup>i</sup> paris aculeo laterali interiore subbasali parvo, tibia 2<sup>i</sup> paris aculeis lateralibus longioribus binis, instructis, metatarsis anticis usque ad basin crebre scopulatis, aculeis basilaribus binis, longis et pronis, tantum munitis. Pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeis dorsalibus binis, altero basali altero submedio, armatis. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, tibia tarsoque fuscis. Plaga genitalis rufula, latior quam longior, fovea media longitudinali, antice attenuata, tenuiter marginata et confuse carinata, utrinque margine crasso valde curvato, postice, pone foveam, plagula parva subquadrata et rugosa, notata.

Stat. 70, Tamala; Stat. 77, Yalgoo; Stat. 80, Eradu; Stat. 91, Mount Robinson prope Kalgoorlie.

*Miturga ferina* n. sp.

♀. Long. 18 mm. Cephalothorax obscure fulvo-rufulus, crebre albidocinereo-pilosus, vittis sat latis binis, extus sinuose-dentatis et utrinque maculis marginalibus trinis parvis et iniquis nigricantibus notatus. Oculi antici in lineam plane rectam, medii lateralibus haud vel vix minores. Oculi postici aequi, in lineam sat recurvam, medii a lateralibus quam inter se duplo remotiores. Oculi medii inter se subaequales, aream vix longiorem quam latiore occupantes. Clypeus oculis anticis fere duplo latior. Abdomen supra fusco-testaceum, nigro-punctatum, obscure cinereo-fulvo-pubesceus, antice vitta longitudinali lata utrinque bilobata, fulva et confuse nigricanti-marginata, postice maculis parvis biseriatis albedo-pilosis et leviter fusco-limbatis ornatum, in lateribus et subtus fulvum, luteo-sericeo-pubesceus, utrinque punctis nigris longis et inordinatis conspersum. Chelae validae, nigrae, nigro-criniferae, margine superiore sulci dentibus trinis medio majore, inferiore dentibus validis binis aequis, armatis. Partes oris nigro-castaneae, ad marginem dilutiores et testaceae. Sternum fusco-rufulum, laeve, luteo-pilosum et nigro-hirsutum. Pedes fulvo-rufuli, metatarsis tarsisque infuscatis, coxis femoribusque subtus dilutioribus, omnino cinereo-albido-pubescentes, tibiis quatuor anticis aculeis inferioribus 3—3 et tibia 2<sup>i</sup> paris aculeis lateralibus interioribus binis parvis munitis. Pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeis dorsalibus binis instructis. Plaga genitalis latior quam longior, utrinque margine crasso fusco et nitido, incurvo, discreta, plagula media albedo-membranacea, antice late foveolata, postice attenuata atque obtusa, munita.

Stat. 158, Broome Hill.

*Miturga catographa* n. sp.

♀. Long. 12—16 mm. Cephalothorax fusco-rufulus, antice fere niger, albidocinereo-pubesceus, vittis binis, extus dentatis et utrinque maculis marginalibus sat magnis et iniquis nigris notatus. Oculi antici aequi, in lineam subrectam (vix procurvam). Oculi postici aequi, in lineam sat recurvam, medii a lateralibus quam inter se plus duplo remotiores. Oculi medii inter se subaequi, aream saltem haud longiorem quam latiore occupantes. Clypeus oculis anticis vix duplo latior. Abdomen superne fusco-cinereum, sat crebre nigro-punctatum et cinereo-albido-pubesceus, punctis biseriatis, antice vitta longitudinali fulvo-testaceis et saepe postice lineolis trinis nigris, in medio leviter ampliatis, notatum, subtus regione ventrali nigra et lineolis testaceis tenuibus quatuor (in sp. junioribus albis et distinctioribus) ornatum. Chelae validae, nigrae et nitidae, parce nigro-criniferae, marginibus sulci ut in *M. ferina* dentatis. Partes oris nigro-

castaneae, ad marginem vix dilutiores. Sternum fuscum, fere nigrum, laeve et nitidum. Pedes fusco-rufuli, albido-cinereo-pilosi, metatarsis tarsisque fere nigris, femoribus subtus dilutioribus, supra paulo obscurioribus, sed, ad radicem aculeorum, minutissime albo-punctatis, ut in *M. ferina* aculeati. Plaga genitalis fere ut in *M. ferina*, sed plagula media magis transversa, multo latiore quam longiore.

Stat. 75, Geraldton; Stat. 99, Lion Mill; Stat. 154, Pickering Brook.

*Miturga Whistleri* n. sp.

♀. Long. 14—15 mm. Cephalothorax brevis sat convexus, fusco-rufulo-castaneus, parte cephalica antice confuse lineata, thoracica linea media tenui, utrinque lineis radiantibus abbreviatis, vittam valde sinuoso-dentatam formantibus, atque ad marginem maculis seriatis 4 vel 5, nigricantibus notatus, albido-cinereo-pilosus, vitta media lata et utrinque vitta marginali dentata et maculata crebrius albido-pilosis, ornatus. Oculi antici inter se subaequales, in lineam plane rectam. Oculi postici aequi, in lineam sat recurvam, medii a lateralibus quam inter se circiter  $\frac{1}{3}$  remotiores. Oculi quatuor medii aream circiter aequae longam ac latam et antice quam postice angustiores occupantes, antici posticis vix minores. Clypeus oculis anticis haud duplo latior. Abdomen superne fusco-testaceum et nigricanti-punctatum, antice late dilutius et parcius punctatum, interdum subvittatum, obscure cinereo-pubescent, punctis minutissimis albo-pilosis biseriatis notatum, subtus nigerrimum, lineolis tenuibus quatuor albis ornatum. Chelae validae et convexae, nigro-nitidae, nigro-crinatae, ad basin et extus parce albido-pilosae. Partes oris nigro-castaneae. Sternum fusco-castaneum, nitidum, parce pilosum. Pedes sat breves et robusti, obscure fusco-rufuli, metatarsis tarsisque fere nigris, cinereo-pilosi, sed coxis dilutioribus et subglabris laete rufulis, tibiis anticis aculeis inferioribus sat debilibus 3—3 armatis, sed lateralibus carentibus, metatarsis usque ad basin crebre scopulatis, aculeis basilaribus binis longis et pronis armatis, pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeis dorsalibus binis munitis. Plaga genitalis fusco-rufula, nitida, circiter aequae longa ac lata, antice in medio leviter emarginata, utrinque ad angulum ampliata atque obtusa, postice leviter attenuata, late foveolata et plagulam planam et nitidam, paulo longiorem quam latiore, includens.

Stat. 137, Collie; Coll. Mus. Hamburg, regione montana „Upper Blackwood district“ (J. M. WHISTLER leg.).

*Miturga impedita* n. sp.

♀ (pullus). Long. 10 mm. Cephalothorax late ovatus, obscure fulvo-rufescens, antice leviter infuscatus, vittis dorsalibus binis dentatis et saepe

interruptis atque utrinque maculis marginalibus iniquis fusco-olivaceis vel nigricantibus ornatus. Oculi antici inter se aequi, antice visi in lineam leviter procurvam. Oculi postici aequi, in lineam sat recurvam, medii a lateralibus quam inter se saltem  $\frac{1}{3}$  remotiores. Oculi medii aream circiter aequae longam ac latam et antice quam postice angustiore occupantes, antici posticis evidenter minores. Abdomen ovatum, supra fulvo-rufescens, in medio parcissime, utrinque crebrius, nigro-atomarium, antice punctis minutissimis, figuram anguste lanceolatam designantibus, et maculis parvis nigris angulosis quatuor, postice punctis nigris biseriatis notatum, subtus regione ventrali nigricanti-olivacea et lineolis albido-testaceis quatuor notata. Chelae nigro-castaneae, ad basin paulo dilutiores, laeves, parce albido-pilosae et nigro-crinitae, marginibus sulci ut in praecedentibus. Partes oris fusco-castaneae. Pedes obscure fulvo-olivacei, femoribus supra late et confuse obscure plagiatis, albido-sericeo-pilosi, tibiis anticis aculeis inferioribus debilibus 3—3 et tibia 2<sup>i</sup> parvis aculeo laterali interiore, in dimidio apicali sito, armatis, metatarsis usque ad basin crebre scopulatis, aculeis basilaribus binis munitis, pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeis dorsalibus binis armatis (vulva haud plane adulta).

Stat. 154, Pickering Brook.

*Miturga agelenina* n. sp.

♀. Long. 18—20 mm. Cephalothorax longe ovatus, fulvo-rufescens, vittis dorsalibus binis sat angustis, parallelis et reticulatis, lineaque marginali tenui, intus leviter umbrosa, nigricantibus ornatus, albo-flavescenti-sericeo-pilosus. Oculi fere ut in praecedenti, sed quatuor medii inter se aequales et aream paulo longiorem quam latiore occupantes. Clypeus oculis anticis haud duplo latior. Abdomen sat longe oblongum, supra fusco-lividum, minutissime et creberrime testaceo-atomarium, vitta media integra et parallela, utrinque lineola nigra tenuissima saepe interrupta et punctis flavidis seriatis, postice sensim minoribus, marginata ornatum (interdum in dimidio anteriore vitta longitudinali flavida, sed fusco-bistriata, in dimidio altero arcubus transversis tenuissimis notatum), subtus, saltem in regione ventrali, nigricans et lineolis tenuibus quatuor, postice abbreviatis albido-testaceis notatum. Chelae nigro-castaneae, laeves, parce albido-pilosae et nigro-crinitae, marginibus sulci ut in praecedentibus. Partes oris fusco-castaneae, testaceo-marginatae et subvittatae. Sternum nigrum nitidum. Pedes fulvo-rufuli, coxis femoribusque (apice exceptis) dilutioribus, albo-flavescenti-pilosi, pedes quatuor antici ut in praecedenti aculeati, sed tibiis quatuor posticis aculeis dorsalibus carentibus. Fovea genitalis rufula et nitida, subrotunda, antice depressa, carinula angusta, antice acuminata, omnino divisa.

♂. Long. 15 mm. A femina differt sterno rufo-castaneo, abdomine subtus nigro haud lineato, sed punctis albis paucis seriatis notato. Pedes-maxillares fulvi, femore patellaque extus fusco-plagiatis, tibia leviter infuscata, tarso nigro fulvo-piloso; tibia patella vix brevior, paulo angustior, apophysi lata, subtus depressa, apice longe et oblique secta cum angulo exteriori minute et acute mucronato, interiore longius producto attenuato, sed truncato, extus ad apicem armata.

Stat. 114, Buckland Hill prope North Fremantle; Stat. 116, East Fremantle, Recreation Ground.

Etiam in Victoria et Tasmania.

A praecedentibus differt cephalothorace angustior, pictura dorsali abdominis, oculis mediis aequis, aream longiorem occupantibus, tibiis posticis aculeis dorsalibus carentibus et tegumentis albido-flavescenti- (non albo-sericeo) pubescentibus.

**Nota:** Descriptiones specierum duarum ex Australia orientali praecedentibus affinium hic addere licitum mihi est:

*Miturga Thorelli* n. sp.

♀. Long. 10—13 mm. Cephalothorax fulvus, vittis dorsalibus binis nigris sat angustis et leviter dentatis, in parte cephalica, pone oculos medios, lineolis binis tenuissimis et appropinquantibus, in thoracica maculis parvis marginalibus fuscis notatus, albido-flavescenti-pilosus, clypeo infusato oculis mediis anticis vix  $\frac{1}{3}$  latiore. Oculi antici in lineam levissime procurvam, medii lateralibus paulo majores. Oculi postici in lineam leviter recurvam, aequi, medii a lateralibus quam inter se vix  $\frac{1}{4}$  remotiores. Oculi quatuor medii aream fere parallelam et vix longiorem quam latiore occupantes, antici posticis majores. Abdomen fulvum, utrinque parce nigropunctatum, supra antice lineolis tenuibus binis, postice confluentibus et utrinque linea, integra, paulo latiore et leviter flexuosa, fuscis, ornatum, subtus in medio nigricans et lineis albidis quatuor ornatum, albido-flavescenti-pilosum. Sternum pedesque pallide fulva, metatarsi tarsisque anticis leviter infuscati. Chelae validae, fusco-castaneae, ad basin fere nigrae, parce nigro-erinitae et albido-pilosae, laeves. Partes oris fulvo-rufulae, ad marginem dilutiores. Tibiae anticae aculeis inferioribus debilibus 3—3 munitae, sed lateralibus carentes, metatarsi antici usque ad basin scopulati, aculeis subbasilaribus binis longis armati. Tibiae posticae aculeis dorsalibus binis munitae. Plaga genitalis circiter aequae longa ac lata, antice depressa, postice castanea et nitida, sed sulco parallelo testaceo divisa.

♂. Long. 9 mm. A femina differt magnitudine minore, pedibus longioribus, anticis magis aculeatis, tibiis utrinque metatarsis intus aculeis latera-



libus binis instructis. Chelae fulvae, extus, in dimidio basali, vitta olivacea, lata et confusa, notatae. Pedes-maxillares longi, pallide fulvi, tarso infuscato, patella longiore quam latiore, aculeis longis binis, altero dorsali altero interiore, munita, tibia patella circiter aequilonga, paulo graciliore, intus aculeis similibus trinis, extus ad apicem apophysi brevi truncata et mucronibus binis geminatis rubro-castaneis, interiore valido recto et conico, exteriori gracili acuto et valde curvato munita, insigniter armata, tarso sat parvo anguste ovato.

**Hab.:** Austr. orient. sept.: Cook Town.

A *M. gilva* L. KOCH et *lineata* TH. (sp. mihi ignotis) differt, secundum L. KOCH, apophysi tibiali maris bimucronata.

### *Miturga serera* n. sp.

♀. Long. 15—17 mm. A *M. ferina*, cui subsimilis est, differt cephalothorace ad marginem anguste fusco-lineato haud maculato, oculis mediis anticis lateralibus paulo minoribus, abdomine fusco-testaceo, cinereo-fulvo-pubescenti, antice paulo dilutius et lineis longitudinalibus tenuibus nigricantibus quatuor, medianis postice convergentibus et figuram lanceolatam designantibus, lateralibus longioribus et rectis, postice punctis parvis alboboliosis biseriatis, notato, subtus in medio confuse infuscato et (praesertim in sp. junioribus) testaceo-quadrilineato, clypeo oculis anticis haud duplo latiore, plaga genitali area media membranacea magis transversa, antice latius et profundius triangulariter foveolata et V magnum fere designante.

♂. Pedes-maxillares rufi, tarso nigro flavido-piloso, tibia patella paulo brevior, apophysibus binis nigris subgeminatis: interiore a basi tarso contigua, multo altiore quam longiore, cariniformi, cum angulo superiore breviter producto et subacuto, exteriori graciliore, incurva, apice oblique secta cum angulo superiore paululum producto acuto et leviter divaricato, extus ad apicem armata.

**Hab.:** Victoria.

A *M. lineata* THORELL (sp. mihi ignota), cui verisimiliter affinis est, differt, sec. L. KOCH, pictura cephalothoracis abdominisque et armatura pedum-maxillarium maris.

### *Diaprograpta* nov. gen.

A *Miturga* differt cephalothorace angustiore et longiore, oculis quatuor anticis apice in lineam subrectam (vix procurvam) inter se valde appropinquatis et validissime iniquis, mediis lateralibus plus triplo minoribus, oculis posticis magnis, aequis, in lineam valde recurvam semicircularem, mediis a lateralibus quam inter se vix  $\frac{1}{4}$  distantioribus, oculis quatuor mediis aream haud vel vix longiorem quam latiore et antice quam postice

saltem duplo angustiore occupantibus, anticis posticis plus triplo minoribus, clypeo oculis lateralibus anticis angustiore, tibiis anticis subtus aculeis setiformibus 2—2 armatis, sed aculeis apicalibus carentibus.

***Diaprograpta striola* n. sp.**

♀. Long. 7 mm. Cephalothorax pallide luteus, sat longe albo-flavescenti-pilosus, vittis dorsalibus binis parallelis et integris sat angustis lineaque marginali tenuissima, antice evanescente, nigris ornatus. Abdomen pallide flavido-testaceum, sat longe albido-pilosum, subtus concolor, supra lineis tenuibus binis appropinquatis, postice convergentibus, contiguis atque in lineam sensim acuminatam productis, in dimidio apicali lineis similibus binis, sed parallelis et abbreviatis, utrinque vitta latiore, leviter dentato-sinuosa, nigris, ornatum, in lateribus parce nigro-punctatum. Partes oris fulvae. Chelae nitidae, subglabrae, luteae, extus vitta lata fusco-olivacea notatae, margine inferiore sulci dentibus binis aequis armato. Sternum laeve, pallide luteum, parce cinereo-pilosum. Pedes pallide lutei, tibiis leviter olivaceo-tinctis, metatarsis tarsisque infuscatis, tibiis anticis aculeis inferioribus 2—2 longis, sed tenuibus et setiformibus, munitis, metatarsis fere usque ad basin scopulatis, aculeis basilaribus binis longis armatis, pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeis dorsalibus binis munitis. Plaga genitalis circiter aequae longa ac lata, fulva et crasse albido-crinata, sed utrinque nigra, antice truncata et evanescente, postice attenuata et utrinque plagulam nigram angulosam gerente.

Stat. 95, Boorabbin.

**Nota:** Genus *Uliodon* (*Amaurobioides* CAMBR.), cui a *Miturga* sat simile est (sed a *Cteno* magis affine videtur) differt chelarum margine inferiore tridentato, metatarsis anticis aculeis 3—3 subtus armatis et oculorum linea postica subrecta (superne visa leviter recurva).

**Subfam. Micariinae.**

**Gen. *Supunna*.**

***Supunna Michaelseni* n. sp.**

♀. Long. 7,5 mm. Cephalothorax longus, nigerrimus, linea media tenui, oculos medios attingente et utrinque linea submarginali, crasse niveo-pilosis decoratus. Oculi postici magni, aequi, in lineam validissime procurvam semicircularem, medii a lateralibus quam inter se saltem  $\frac{1}{3}$  remotiores. Oculi antici in lineam angustioremin minus procurvam, medii rotundi lateralibus ovatis fere duplo majores, inter se quam a lateralibus remotiores. Oculi medii aream multo longiorem quam latioremin et antice



quam postice paulo angustiores occupantes. Clypeus verticalis et leviter depressus, area oculorum non multo angustior. Abdomen supra nigerrimum, antice macula longitudinali abbreviata, prope medium maculis binis parvis, dein macula media parva subquadrata, posticeque maculis binis subtriquetris, utrinque in latere maculis longis trinis iniquis, niveo-pilosis subsquamulatis, decoratum, subtus paulo dilutius et pilis plumosis albis vestitum, regione epigastri coriacea, fusca et nitida, depressione superficiali magna et subparallela munita. Sternum nigro-nitidum, pilis albis plumosis conspersum. Chelae validae, nigro-nitidae, margine inferiore sulci dentibus binis aequis et subcontiguïs, superiore crasse scopulato et dente angulari valido armatis. Pedes sat robusti, inter se valde iniqui, pedes 4i paris reliquis multo longiores, quatuor antici fulvo-olivacei, coxis femoribusque dilutioribus, pedes postici nigri, coxis tarsisque fulvis, maculis annulisque parvis niveo-pilosis decoratis, antici aculeis setiformibus paucis, postici aculeis validioribus et numerosis ordinariis armati. (Vulva haud plane adulta.)

A *S. versicolori* E. SIMON (Ann. Soc. ent. Belg., XL, 1896, p. 407) ex Victoria, cui subsimilis est, differt oculis posticis majoribus, mediis inter se spatio oculo angustiore separatis, pictura abdominis paulo alia, pedibus anticis fulvo-olivaceis, femoribus dilutioribus (in *S. versicolori* laete flavis, coxis basique femorum infuscatis).

Stat. 136, Harvey.

### *Supunna smaragdinea* n. sp.

♀. Long. 5 mm. Cephalothorax angustus et longus, antice posticeque fere aequaliter attenuatus, stria thoracica submedia brevi impressus, crebre coriaceus, niger et smaragdineo-tinctus, pilis albidis crassis, longe plumosis, paucis conspersus. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii inter se spatio oculo saltem duplo minore distantes, a lateralibus minoribus subcontigui. Oculi postici inter se subaequales, in lineam validissime procurvam, medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores, spatio interoculari oculo evidenter latiore. Oculi quatuor medii inter se subaequales, aream multo longiorem quam latiore et antice quam postice angustiores occupantes. Oculi laterales spatio oculo non minore separati, posticus antice major. Clypeus verticalis, planus, oculis anticis saltem triplo latior. Abdomen ovatum, teretiusculum, postice leviter ampliatus, nigerrimum, supra antice scuto abbreviato et truncato, convexo, duriusculo et nitido, violaceomicanti, munitum, pilis plumosis fulvis conspersum, subtus pilis longioribus albidis munitum, regione epigastri duriuscula nigro-castanea, foveis magnis et profundis, septo angusto separatis, valde impressa. Sternum nigrum, crebre coriaceum, granulis parvis, setas albas nigrasque gerentibus, conspersum. Chelae validae, nigro-nitidae, intus ad apicem paulo dilutiores.

ad basin subtilissime transversim striatae, margine inferiore sulci longe obliquo, dente unico remoto et angulari armato. Partes oris nigrae, laminae intus testaceo-marginatae. Pedes modice longi, apice graciles, fusco-castanei, femoribus intense nigris, tarsis luteis, parce albo-pilosi, tibiis anticis aculeis inferioribus gracilibus et longis 2—2, metatarsis, leviter scopulatis, aculeis brevioribus 2—2, subtus armatis.

Stat. 98, Wooroloo.

Species sat ambigua, fere inter *Supunnam* et *Poeciloptam*, in formicarum caverna capta.

### *Liparochrysis* nov. gen.

Cephalothorax ovatus, sat humilis, stria thoracica brevi sed profunda impressus. Oculi postici, superne visi, in lineam subrectam (vix recurvam), inter se anguste et aequae separati, medii lateralibus fere  $\frac{1}{3}$  minores. Oculi antici inter se subcontigui et valde iniqui, medii lateralibus fere triplo minores, apicibus in lineam rectam, area quatuor mediorum paulo longior quam latior et antice quam postice multo angustior. Clypeus angustus. Sternum late ovatum, postice, inter coxas disjunctas, obtusum. Pedes, metatarsis tarsisque exceptis, sat robusti, omnino mutici, postici anticis paulo breviores.

Genus valde singulare, a *Micariolepi* oculis cunctis confertis et lineas binas subrectas designantibus, pedibus omnino muticis, sterno postice obtusiore et coxis posticis disjunctis, petiolo abdominali brevi, abunde differt.

### *Liparochrysis resplendens* n. sp.

♂. Long. 2,8 mm. Cephalothorax sat longe ovatus, niger et opacus, omnino tenuiter coriaceus, pilis simplicibus, tenuibus et pronis, albidis, conspersus. Abdomen nigrum, superne et in lateribus squamulis grossis laetissime aureis, splendide roseo viridique micantibus, obtectum, subtus paulo dilutius et simpliciter albido-pilosum. Sternum nigro-opacum, subtiliter coriaceum, parce albo-pilosum. Chelae parum robustae, intus leviter deplanatae, fusco-olivaceae, coriaceae, setis albidis validis conspersae. Pedes sat robusti, sed metatarsis tarsisque gracilibus, longi, antici posticis longiores, nigri, coxis (anticis exceptis) fulvo-testaceis, tibiis annulo apicali albo-testaceo ornatis, metatarsis ad apicem tarsisque fulvis. Pedes-maxillares fulvo-olivacei, patella haud longiore quam latiore, tibia patella circiter aequilonga, graciliore, apophysi carente, sed extus ad apicem breviter et obtuse prominula, tarso sat late ovato, bulbo simplici ovato.

Stat. 138, Luenenbergl.

## Subfam. Corinninae.

Gen. *Asadipus*.*Asadipus nitidiceps* n. sp.

♂. Long. 6 mm. Cephalothorax late ovatus et convexus, nigro-castaneus, parte cephalica laevi et nitida, sed praesertim utrinque subtiliter transversim rugata, thoracica granulis parvis, lineas radiantes parum regulares designantibus, munita. Oculi antici in lineam leviter procurvam, inter se subaequales et fere aequidistantes. Oculi postici in lineam vix procurvam, medii multo majores, plani ovati et subtriquetri, inter se appropinquati, a lateralibus spatio oculo circiter aequilato separati. Oculi medii aream latiore quam longiorem et subparallelam occupantes. Clypeus oculis lateralibus anticis haud latior. Abdomen supra nigro-nitidum, postice, supra mamillas, macula parva testacea confusa notatum, subtus paulo dilutius, regione epigastri duriuscula fusco-rufula, impressionibus binis curvatis munita. Sternum rufulum, nitidum, parce et longe nigro-crinium. Chelae validae, convexae, fere geniculatae, fusco-rufulae, laeves et nitidae, parce et longe nigro-crinatae, margine inferiore sulci brevi et subtransverso, dentibus binis juxta contiguus, 2<sup>o</sup> 1<sup>o</sup> majore, armato. Pedes pallide fulvi, femoribus, praesertim anticis, plus minus infuscatis, tibiis posticis aculeo medio inferiore apicalibusque binis minutissimis tantum instructis. Pedes-maxillares sat graciles et longi, femore longo leviter curvato, subtus, ad marginem interiorem, subcarinato, patella cylindracea, longiore quam latiore, tibia patella circiter aequilonga, extus prope medium tuberculo parvo conico munita, in dimidio apicali leviter depressa atque apophysi apicali, ad angulum inferiorem inserta, sat brevi, acuta et antice curvata, armata, tarso ovato, mediocri, tibia non multo longiore, bulbo ovato, convexo, simplici, apophysi apicali nigra brevi munito.

♀. Long. 7 mm. A mari differt abdomine cinereo-fuliginoso, subtus dilutius, pedibus multo brevioribus, aculeo inferiore tibiarum posticarum longiore. — Pedes-maxillares fusco-rufuli. Plaga genitalis fulva et nitida, laevis et plana, antice fovea transversa, carinula, in medio coarctata (antice nigra praeterea fulva) divisa, impressa.

Stat. 116, East Fremantle, Recreation Ground; Stat. 148, Busselton.

Ab *A. insolenti* E. SIMON, ex Australia sept. orientali, differt parte cephalica convexiore, laevi, oculis mediis posticis majoribus, a lateralibus minus remotis, oculis anticis inter se subaequis (in *A. insolenti* mediis majoribus), sterno rufulo laevi (in *A. insolenti* nigro atque ad marginem minute

granuloso), tibiis posticis parcissime aculeatis, pedibus-maxillaribus multo gracilioribus etc.

*Aristerus* nov. gen.

Ab *Asadipo* imprimis differt chelarum margine inferiore longius obliquo et dentibus trinis armato, tibiis metatarsisque posticis aculeis debilibus paucis armatis, a *Stratio* differt oculis mediis posticis lateralibus multo majoribus, ovatis, subangulosis et inter se subcontiguis.

*Aristerus phaleratus* n. sp.

♂. Long. 4 mm. Cephalothorax late ovatus et convexus, nigro-castaneus, omnino minute et crebre granulatus, pilis cinereis, tenuibus et longis, vestitus. Oculi antici in lineam procurvam, medii nigri lateralibus albis majores et inter se quam a lateralibus remotiores. Oculi postici in lineam latiore subrectam, medii lateralibus fere duplo majores, late ovati et obliqui, a lateralibus quam inter se plus duplo remotiores (spatio inter medios oculo plus duplo minore). Clypeus oculis lateralibus anticis paulo lator. Abdomen breviter ovatum, obscure cinereo-testaceum, supra scuto duriusculo castaneo, minute et crebre rugoso, fere omnino obtectum, pilis brevibus luteo-nitidis vestitum, subtus dilutius, longius pilosum, regione epigastri duriuscula rubra et nitida. Sternum obscure rubro-castaneum, granulis parvis conspersum, sed area media laevi longitudinali munitum. Chelae fusco-castaneae, validae et convexae, intus fere laeves, extus parce granulosa. Pedes fulvo-rufuli, femoribus anticis vix obscurioribus, breviter pilosi, tibiis posticis aculeis inferioribus trinis uniseriatis apicalibusque binis minutissimis armatis. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, femore paulo dilutius, robusto, patella paulo longiore quam latiore, leviter convexa, tibia patella brevior sed latiore, extus, ad angulum superiorem, apophysi tenui styloformi, articulo multo longiore et dimidium tarsi superante, antice directa et levissime incurva, insigniter armata, tarso maximo, late ovato extus subrecto, intus ad basin ampliato et subrotundo, apice attenuato, sed obtuso et curvato, bulbo magno, simplici, leviter reniformi.

♀. A mari differt cephalothorace paulo longiore, oculis anticis inter se minus iniquis, pedibus paulo brevioribus. Area genitalis rufula, plaga media nigra, nitida, vix longior quam lator, postice obtusa, antice fovea profunda et transversa, ad marginem posticum leviter et obtuse trifida, impressa.

Stat. 76, Day Dawn; Stat. 77, Yalgoo; Stat. 95, Boorabbin.

## Fam. Agelenidae.

## Subfam. Nicodaminae.

Gen. *Nicodamus* E. Simon.

*Centropelma* L. KOCH (praeocc.). — *Oxaleus* THORELL.

*Nicodamus bicolor* (L. Koch).

*Centropelma* b. L. KOCH, Ar. Austr., I, 1872, p. 246, tab. XX, fig. 5.

Coll. Mus. Perth, Murchison district?; Stat. 75, Geraldton; Stat. 80, Eradu; Stat. 84, Dongarra; Stat. 88, Moora; Stat. 95, Boorabbin; Stat. 116, East Fremantle, Recreation Ground; Stat. 127, Mundijong; Coll. Mus. Hamburg, regione montana „Upper Blackwood district“ (J. M. WHISTLER leg.); Stat. 167, South Albany.

Species vulgatissima per Australiam totam diffusa.

## Subfam. Cybaeinae.

Gen. *Desis*.*Desis Hartmeyer* n. sp.

♀ (pullus). Long. 8—10 mm. Cephalothorax humilis, subparallelus, opacus, pallide fusco-rufescens. Oculi postici inter se late et fere aequae separati, medii lateralibus evidenter minores, spatio oculo plus triplo latiore inter se distantes. Oculi medii antici nigri, inter se appropinquati, a lateralibus, albis et leviter ovatis, late separati. Abdomen oblongum, fulvo-cinereum, pallide cinereo-pilosum. Chelae validae, longae et proclives, laeves, laete rufulae, margine superiore sulci dentibus seriatim acutis 6, radicem unguis haud attingentibus, basali minutissimo, reliquis inter se aequis et fere aequidistantibus, margine inferiore dentibus binis valde iniquis, apicali valido conico et obliquo, altero duplo minore recto et acuto. Partes oris fusco-rufulae, pars labialis apice testacea. Sternum paulo dilutius, subtilissime coriaceum. Pedes pallide fulvi, longe et tenuissime pilosi, aculeis parvis apicalibus tibiaram et metatarsorum posticorum exceptis, mutici.

Stat. 165, Albany.

A *D. marina* HECTOR (*D. Robsoni* POWELL), cui praesertim affinis est, differt pedibus posticis fere muticis. A *D. Kenyonae* Pocock oculis posticis inter se fere aequidistantibus et dentibus chelarum marginis superioris

inter se aequidistantibus, a *D. maxillosa* FABR. (*dysderoides* WALCK.) et *voraci* L. KOCH oculis posticis inter se distantioribus et pedibus posticis multo minus aculeatis, a *D. Martensi* L. KOCH dentibus binis marginis inferioris inter se valde iniquis praesertim differt.

## Subfam. Hahninae.

### Gen. *Scotopsilus*.

Specimina parva valde immatura et mutilata, ad Stat. 162, Torbay, inventa, examinavi.

## Fam. Pisauridae.

### Gen. *Dolomedes*.

#### *Dolomedes facetus* L. KOCH.

Ar. Austr., I, 1876, p. 869, tab. LXXIV, fig. 5—6.

Stat. 133, Pinjarra; Stat. 143, Bunbury; Stat. 146, Boyanup, Stat. 147, Boyanup, lacu aquae dulcis; Stat. 165, Albany.

Haec species per Australiam occidentalem et orientalem, N. Zeelandiam et, sec. L. KOCH, insulam Upolu dictam, diffusa est.

*Dolomedes stilatus* KARSCH (Zeitschr. f. g. Naturw., LI, 1878, p. 814) ex Australia occidentali, a *D. faceto* fortasse non differt.

## Fam. Lycosidae.

### Gen. *Lycosa*.

#### Sectio I. Chelarum margo inferior tridentatus.

##### A. (typus *Lycosa tarentula* ROSSI).

#### Conspectus specierum Australiae occidentalis.

Abdomen subtus omnino nigrum *L. Christopheri* n. sp. et *L. Woodwardi* n. sp.

Abdomen subtus nigrum, regione ventrali macula magna albida vel testacea notata . . . . . *L. Leuckarti* TH.

Abdomen subtus album, regione ventrali macula maxima nigra transversa et postice leviter emarginata notata . . . . . *L. immansueta* n. sp.

Abdomen subtus regione epigastri fulvo-olivacea, regione ventrali flavo-aurantiaca, antice ad rimam linea transversa nigra marginata.

*L. dimota* n. sp.



*Lycosa Leuckarti* (Thorell).

*Tarentula* L. T. THORELL, in Öfv. Kongl. Vetensk.-Akad. Förh., 1870, No. IV, p. 388.  
*Lycosa* L. L. KOCH, Arachn. Austr., p. 896, tab. LXXVII, fig. 3 (♀), LXXXI, fig. 1 (♂).

Stat. 98, Wooroloo; Stat. 103, Guildford; Stat. 116, Fremantle, Recreation Ground; Stat. 145, Donnybrook; Stat. 152, Gooseberry Hill; Stat. 155, York; Stat. 156, Beverley.

Exempla multa. Species magna et pulchra in Australia occidentali frequentissima, etiam in Austr. orientalem, sec. L. KOCH, occurrit.

*Lycosa Christopherei* n. sp.

♀. Long. 25—27 mm. Cephalothorax fusco-castaneus, cervino-pubescent, vitta marginali albidior einctus, parte thoracica linea media angusta lineolisque radiantibus exilibus albo-pilosis et nigro-marginatis notata. Oculi antici inter se sat anguste et fere aequae distantes, medii lateralibus paulo majores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> paulo remotiores. Oculi ser. 2<sup>ae</sup> magni, spatio oculo circiter  $\frac{1}{3}$  minore inter se separati. Abdomen oblongum, supra fuscum, albido cervinoque pubescens, antice vitta longitudinali lata sed acuminata, obscuriore sed late albido-limbata, postice arcubus tenuibus nigricantibus, albido-marginatis et notatum, subtus omnino nigrum et nigro-pilosum. Chelae validae, nigrae, crebre flavido-aurantiaco-hirsutae, sed intus atque ad apicem fere glabrae, margine inferiore sulci valde tridentato. Partes oris, sternum coxaeque nigrae et nigro-pilosa. Pedes fusco-castanei, breviter et crebre cinereo-albido-pilosi, sed femoribus anticis et subtus et intus flavido-tinctis. Area genitalis fovea superficiali fusco-castanea, subquadrata, antice et utrinque marginata, septo plano, antice lato (fovea vix angustiore) et leviter emarginato, postice valde acuminato, triquetrum vel acute cordiformi, divisa, impressa.

Coll. Mus. Hamburg, Fremantle (WÖLTING leg., H. CHRISTOPHER ded.).

*Lycosa Woodwardi* n. sp.

♀. Long. 18—19 mm. Cephalothorax fusco-castaneus, cervino-pubescent, vitta marginali, linea media thoracica angusta lineolisque radiantibus exilibus albo-pilosis ornatus. Oculi antici inter se subaequales, medii vix majores, anguste et fere aequae separati, in lineam procurvam, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> paulo remotiores. Oculi ser. 2<sup>ae</sup> magni, spatio oculo vix  $\frac{1}{4}$  minore inter se distantes. Abdomen oblongum, supra fuscum et cervino-pubescent, antice vitta lata, sed acuminata, obscuriore, late albido-limbata et linea tenui nigra interrupta discreta, postice arcubus transversis tenuibus (1<sup>o</sup> interrupto) nigris et tenuissime albo-marginatis

notatum, subtus omnino nigrum et nigro-pilosum. Chelae validae, nigrae, sublaeves, in dimidio basali et extus crebre albido-flavido-hirsutae, margine inferiore sulci valde tridentato. Partes oris, sternum coxaeque nigra et nigro-pilosa. Pedes fusco-castanei, breviter et crebre albido-cinereo-pilosi, femoribus anticis subtus vix flavescenti-tinctis. Area genitalis fovea superficiali vix longiore quam latiore, utrinque oblique marginata, antice septum nigrum triquetrum, postice plagulam paulo convexiorem, rufulam. transversam et antice minute biimpressam, includente, impressa.

Stat. 71, Northampton; Stat. 83, Dongarra; Stat. 156, Beverley.

*Lycosa immansueta* n. sp.

♂. Long. 15 mm. Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica paulo dilutiore, et crebre albido-fulvescente-pilosa, thoracica linea media angusta, linea marginali lineolisque radiantibus albo-pilosis notata. Oculi antici in lineam leviter procurvam, inter se fere aequae et anguste separati, medii lateralibus fere duplo majores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> remotiores. Oculi magni ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo fere  $\frac{1}{3}$  minore inter se distantes. Abdomen oblongum, supra cinereo-albido-pubescent, in dimidio basali vitta longitudinali, postice truncata et acute angulosa, dein vitta simili, sed minore, in dimidio apicali utrinque maculis binis longis et obliquis nigerrimis ornatum, subtus albidum et albo-pubescent, sed regione ventrali macula maxima nigerrima, transversa, postice leviter emarginata, oblecta. Chelae validae, nigrae, ad basin et extus crebre albido-flavescenti-hirsutae, praeterea parce nigro-setosae, margine inferiore sulci tridentato, dente apicali reliquis paulo minore. Partes oris, sternum coxaeque nigra et nigro-pilosa, sed coxis posticis, saltem ad marginem posticum, dilutioribus. Pedes sat longi, fulvo-rufuli, breviter et crebre albido-cinereo-pilosi, femoribus dilutioribus, anticis extus confuse fusco-lineatis. Pedes-maxillares fusco-rufuli, cinereo-albido-pilosi, sed femore subtus nigricanti supra aculeis 1—4 armato, patella intus prope basin seta spiniformi munita, tibia mutica, patella haud vel vix longiore, tarso sat anguste et longe ovato, bulbum multo superante, bulbo nigro sat convexo.

♀. Long. 15—18 mm. A mari differt pedibus brevioribus, chelis nigris, antice, in dimidio basali crebre flavo-nitido-hirsutis. — Plaga genitalis leviter depressa, longior quam latior, antice sensim attenuata atque obtusa, rufula et rugosa, tenuiter nigro-marginata, sulco longitudinali, carinula tenui nigra secto, omnino divisa et postice utrinque tuberculo parvo nigro notata.

Stat. 98, Wooroloo; Stat. 123, Cannington.



Fig. 1. *Lycosa immansueta* n. sp. Plaga genitalis feminae.



A *L. ramosa* L. KOCH imprimis differt macula nigra ventrali rimam haud attingente, magis transversa, postice non acuminata sed leviter emarginata.

***Lycosa dimota* n. sp.**

♀. Long. 16 mm. Cephalothorax longus, fusco-castaneus, flavido-cinereo-pubescent, ad marginem dilutior, parte thoracica lineolis radiantibus dilutioribus notata. Oculi antici in lineam valde procurvam, medii laterilibus  $\frac{1}{3}$  majores et a lateralibus quam inter se paulo remotiores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> remotiores. Oculi magni ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo fere  $\frac{1}{4}$  minore inter se distantes. Abdomen oblongum, supra crebre rubro-cervino-pubescent, antice vitta longitudinali. lata et abbreviata, paulo obscuriore sed confusa, notatum, subtus regione epigastri nigro-olivacea, regione ventrali lacte flavo-aurantiaca, sed antice ad rimam linea transversa nigerrima discreta. Chelae validae, nigrae, ad basin et extus crasse et crebre flavo-cervino-hirsutae, praeterea parce nigro-setosae, margine inferiore sulci dentibus trinis, medio majore, armato. Partes oris sternum coxaeque nigra et nigro-pilosa. Pedes robusti, pallide fusco-rufuli, breviter et crebre cinereo-fulvo-pilosi. Fovea genitalis paulo longior quam lator, antice leviter attenuata et obtuse truncata, septo rufulo lato leviter fusiformi, ad marginem posticum abrupte ampliato cum angulis obtusis nigris divisa.

Stat. 76, Day Dawn.

A *L. palabunda* L. KOCH, cui praesertim affinis est, differt mamillis haud nigro-cinctis, a *L. semicincta* L. KOCH differt regione epigastri obscuriore et foveae genitali multo brevior.

**AA. (typus *L. pullastra*).**

Chelae nigrae, leviter rugosae et saltem intus subtiliter striatae, parce nigro vel cinereo rarius fulvo-crinitae, margine inferiore sulci dentibus trinis armato, dente apicali minutissimo saepe vix perspicuo, reliquis validis, medio altero paulo longiore. Pedum anticorum tibiae aculeis inferioribus debilibus 3—3 aculeoque laterali interiore parvo, metatarsi aculeis inferioribus validioribus 2—2 aculeisque apicalibus trinis minutissimis (medio et utrinque angulari) armati.

***Lycosa pullastra* n. sp.**

♀. Long. 10 mm. Cephalothorax niger, vitta media angusta et integra, paulo dilutior et cervino-flavido-pilosa ornatus. Oculi antici in lineam sat procurvam, inter se fere aequae et sat anguste separati, medii lateralibus saltem  $\frac{1}{3}$  majores. Oculi magni ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo vix  $\frac{1}{4}$  angustior inter se distantes. Oculi laterales antici a margine clypei quam ab oculis

ser. 2<sup>ae</sup> non multo remotiores. Abdomen nigrum, in medio leviter dilutius et rufescenti-tinctum, ad marginem anticum vitta media flavido-pilosa, valde abbreviata et evanescente et utrinque punctis minutissimis albo-pilosis paucis et seriatis, notatum, subtus fulvo-testaceum, flavido-pubescent, minute et parce fusco-atomarium. Sternum nigrum, nigro-setosum. Chelae et partes oris nigrae, laminae ad apicem obscure testaceae. Pedes fusci, confuse annulati. Plaga genitales nigra, haud vel vix latior quam longior, fovea antice sat angusta, sed utrinque anguloso-ampliata, septo crasso nigro valde attenuato et triquetro divisa, postice plagula transversa rufula, subtiliter striata et utrinque margine semicirculari sat tenui, munita.

Stat. 101, Mundaring Weir; Stat. 164, prope Albany.

### *Lycosa marcentior* n. sp.

♀. Long. 12 mm. Cephalothorax niger, linea marginali longe albo-pilosa cinctus, et vitta media sat angusta, in parte cephalica levissime ovata et cervino-luteo-pilosa, in thoracica angustiore et albedo-pilosa ornatus. Oculi antici in lineam leviter procurvam, inter se fere aequidistantes, medii paulo majores. Oculi magni ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo vix  $\frac{1}{5}$  angustiore inter se distantes. Oculi laterales antici a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> non multo remotiores. Abdomen nigrum, obscure cervino-pubescent, antice vitta longitudinali sat angusta et leviter flexuosa, medium haud attingente, dilutius et flavido-pilosa, et utrinque punctis minutissimis albo-pilosis seriatis 5 vel 6 ornatum, subtus fulvo-testaceum, flavido-cervino-pubescent, confuse fusco-marginatum et vitta media lata obscuriore, parum expressa, mamillas haud attingente, notatum. Sternum nigrum, parce nigro-setosum. Chelae et partes oris nigrae, laminae ad apicem rufulo-tinctae. Pedes pallide fusco-rufuli, femoribus paulo dilutioribus, late obscure plagiati et subannulati. Plaga genitales nigra, paulo latior quam longior, fovea in dimidio anteriore utrinque anguloso producta et marginata, septo lato triquetro, sed apice abrupte et tenuiter producto, divisa, in dimidio altero utrinque crasse marginata et plagulam mediam, valde depressam, subtiliter carinatam et postice carina transversa subacuta discretam, includente, impressa.

Stat. 84, Dongarra; Stat. 146, Boyanup.



Fig. 2. *Lycosa pulastra* n. sp. Plaga genitales feminae.




Fig. 3. *Lycosa marcentior* n. sp. Plaga genitales feminae.

*Lycosa segregis* n. sp.

♀. Long. 10 mm. Cephalothorax niger, vitta marginali parce albo-pilosa parum distincta cinctus, et vitta media angusta flavido-cervino-pilosa,



Fig. 4. *Lycosa segregis* n. sp. Plaga genitalis feminae.

postice versus marginem albidior, ornatus. Oculi ut in praecedenti. Abdomen supra nigrinum, obscure cervino-pubescent, confuse et inordinate nigricanti-maculatum et plagiatum, antice vitta longitudinali angusta et acuminata, medium haud attingente, flavido-pilosa et tenuiter nigro-marginata ornatum, subtus fulvotestaceum, utrinque parcellissime fusco-punctatum, omnino cervino-flavido-pubescent. Chelae, partes oris pedesque ut in praecedenti. Plaga genitalis fere simili, sed septo

antere multo longiore et longius acuminato, plagula rufula postica multo latiore quam longiore arcuata, vix striata.

Stat. 37, Fremantle, ad subicam in aqua marina portus.

*Lycosa propitia* n. sp.

♀. Long. 7 mm. Cephalothorax niger, vitta media angusta et integra, antice cervino-flavido-pilosa, postice sensim albidior et utrinque linea marginali lineaque submarginali leviter flexuosa albo-pilosis ornatus. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii lateralibus saltem  $\frac{1}{3}$  majores, inter se quam a lateralibus vix remotiores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2ae paulo remotiores. Oculi ser. 2ae magni, spatio oculo fere  $\frac{1}{3}$  minore inter se separati. Abdomen supra fuscum, confuse nigro-punctatum et plagiatum, ad marginem anticum dilutius et vitta longitudinali angusta et acuminata, medium haud attingente, flavido albidoque pilosa, ornatum, subtus dilutius et albidopilosum, confuse, saepe obsolete, cinereo-lineatum. Partes oris fuscae, apice dilutiores. Sternum nigrum, opacum, parce albidopilosum. Chelae validae, laeves, obscure fuscorufulae, versus apicem sensim nigrae, parce cervino-crinatae.




Fig. 5. *Lycosa propitia* n. sp. Plaga genitalis feminae.

Pedes fulvi, parce flavido-pilosi, late sed confuse fuscolivaceo-annulati, tibiis 1i paris aculeis inferioribus debilibus 3—3, medianis longioribus aculeoque laterali interiore subapicali parvo, tibiis 2i paris aculeis binis uniseriatis, ad marginem anteriorem sitis, apicalibus binis lateraleque interiore parvo, metatarsis quatuor anticis aculeis validioribus 2—2 apicalibusque minoribus trinis armatis, pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeis dorsalibus binis munitis. Fovea genitalis parva, rufula, multo longior quam latior, antice attenuata, carinula tenni, sed postice in plagulam transversam abrupte ampliata, omnino divisa.

Stat. 123, Cannington.

*Lycosa percauta* n. sp.

♀. Long. 7 mm. Cephalothorax niger et nigro-pubescent, vitta media angusta, postice acuminata et utrinque linea marginali exili lineaque submarginali albo-pilosis ornatus. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii inter se quam a lateralibus paulo remotiores et saltem  $\frac{1}{4}$  majores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> paulo distantiores. Oculi ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo vix  $\frac{1}{4}$  angustiore inter se separati. Abdomen supra nigrinum, nigro cervinoque pubescens, antice vitta longitudinali angusta et acuminata, utrinque punctis parvis seriatis 4 vel 5 albo-pilosis ornatum, subtus fulvum, cervino-flavido-pubescent, in lateribus minute et parce fusco-atomarium. Chelae validae, nigrae, parce nigro-crinatae, margine inferiore sulci tridentato, dente apicali parvo, medio reliquis longiore. Partes oris sternumque nigra, parce nigro-setosa, laminae apice dilutiores et rufulo tinctae. Pedes robusti, fusco-rufuli, tenuiter et longe pilosi, tibiis, saltem posticis, confuse annulatis, tibiis anticis aculeis inferioribus debilibus 3—3, apicalibus minoribus atque aculeo laterali subapicali interiore, metatarsis rare scopulatis aculeis inferioribus longis 2—2 apicalibusque parvis trinis munitis. Pedes postici numerose aculeati, patellis utrinque uniaculeatis, tibiis aculeis dorsalibus binis armatis. Plaga genitalis nigra, postice convexa atque in declivitate fovea trapezoidali, septo divisa, impressa.

Stat. 121, Rottneſt.

*Lycosa impedita* n. sp.

♀. Long. 7 mm. Cephalothorax niger, nigro-pubescent, versus marginem parce albo-pilosus, vitta media lata, sed postice acuminata, dilutior et rufula cervino-flavido-pilosa ornatus. Oculi antici in lineam leviter procurvam, medii lateralibus haud vel vix majores et inter se quam a lateralibus paulo remotiores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> non multo remotiores. Oculi ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo haud vel vix angustiore inter se separati. Abdomen oblongum, supra nigellum, cervino albidoque pilosum, in dimidio basali vitta longitudinali flavida sat angusta et longe acuminata notatum, subtus dilutius, regione epigastri parce albido-pilosa, ventrali crebre flavido-cervino-pubescenti et confuse fusco vittata. Chelae validae fusco-castaneae, parce fulvo-cervino-setosae, margine inferiore sulci tridentato, dente medio reliquis longiore. Partes oris sternumque nigra parce nigro-setosa, laminae apice rufulo-tinctae. Pedes fulvo-rufuli, versus extremitates sensim obscuriores, femoribus annulis nigris trinis valde sinuoso-dentatis et saepe interruptis cinctis, tibiis nigro-variegatis et subannulatis, tibiis anticis aculeis inferioribus longis 2—2 apicalibusque parvis binis et utrinque



Fig. 6. *Lycosa impedita* n. sp. Plaga genitalis feminae.

aculeo laterali, in dimidio apicali sito, metatarsis haud scopulatis, aculeis inferioribus 3—3 apicalibus minoribus et utrinque aculeo laterali armatis. Pedes postici numerose aculeati, patellis utrinque uniaculeatis aculeoque dorsali apicali parvo, tibiis aculeis dorsalibus binis, altero subbasali altero in dimidio apicali sito, armatis. Plaga genitales saltem duplo latior quam longior, transversim semicircularis, septo medio rufulo plano, sed lato et parallelo, divisa, utrinque impressa et margine rufulo crasso et obliquo discreta.

Stat. 152, Gooseberry Hill.

Species sat incertae sedis, a praecedentibus, tibiis metatarsisque anticis numerosius aculeatis, chelarum margine inferiore dente apicali basali haud minore (sed medio humiliore) et structura genitales abunde differt.

*L. (Aretosa) C. KOCH*, typus *L. cinerea* FABR.)

### *Lycosa oraria* L. Koch.

Ar. Austr., p. 883, tab. LXXVI, fig. 2—3.

Stat. 119, Fremantle, Obelisk Hill.

Haec species a *L. lacustri* E. S. et *L. perita* LATREILLE, ex Europa, sat similis, a King Georges Sund, sec. L. KOCH, inventa est.

### *Lycosa sibyllina* n. sp.

♀. Long. 8 mm. Cephalothorax nigellus, parte cephalica paulo dilutius ferruginea et pallide flavido-pilosa, thoracica vitta submarginali sat angusta et dentata, albido flavidoque pilosa, cincta. Oculi antici in lineam rectam, oculorum lineae 2ae paulo latiore, inter se sat anguste et fere aequae separati, medii lateralibus majores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2ae evidenter remotiores. Oculi magni ser. 2ae spatio oculo fere duplo angustiore inter se distantes. Abdomen supra nigrum, nigro cervinoque pubescens, antice vitta longitudinali angusta et acuminata, medium



Fig. 7. *Lycosa sibyllina* n. sp. Plaga genitales feminae.

haud attingente, fulva et flavido-pilosa, utrinque punctis minutissimis seriatis 3 vel 4 albo-pilosis ornatum, subtus obscure fulvum flavido-cervino-pubescent, parce fusco-atomarium et postice lineis binis obscurioribus convergentibus et confusis notatum. Chelae validae, rufulae et nitidae, margine inferiore sulci dentibus sat distantibus trinis, medio reliquis multo majore, armato. Partes oris fusco-castaneae.

Sternum coxaeque obscure fulva. Pedes robusti, parum longi, fusco-rufuli, femoribus paulo dilutioribus, subtus late obscure plagiatis subannulatis, pilis tenuibus longis parum dense vestiti et maculis punctisque albido-flavido-pilosis conspersi, tibiis anticis aculeis inferioribus debilibus 3—3, medianis sat longis (praesertim interiore), basalibus setiformibus, apicalibus parvis, sed lateralibus carentibus, metatarsis aculeis validioribus

2—2 apicalibusque minoribus trinis munitis. Pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeo dorsali unico, in dimidio apicali sito, armatis. Pedes-maxillares obscure fulvo-rufuli. Plaga genitilis nigra, fovea magna et profunda, multo latiore quam longiore, antice fere recta, utrinque attenuata, rotunda vel leviter angulosa, postice valde acuminata et plagulam parvam sulcatam includente, impressa.

Stat. 165, Albany.

A *L. oraria* L. KOCH differt magnitudine minore, tibiis metatarsisque aculeis lateralibus carentibus, pictura cephalothoracis et abdominis, tibiis haud annulatis, fovea genitili antice haud emarginata et septo multo minore, marginem foveae haud superante, divisa.

### *Lycosa properipes* n. sp.

♂. Long. 9 mm. Cephalothorax obscure fuscus, parce cervino-pilosus, parte thoracica linea media lineaque marginali longe et crebre flavido-cervino-pilosis confuse notata. Oculi antici in lineam subrectam (vix procurvam) oculorum linea 2<sup>a</sup> evidenter latiore, medii lateralibus saltem  $\frac{1}{3}$  majores et inter se quam a lateralibus vix remotiores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> saltem triplo distantiores. Oculi ser. 2<sup>ae</sup> mediocres, spatio oculo fere  $\frac{1}{3}$  minore inter se disjuncti. Abdomen nigellum, supra cinereo-nigricanti-pubescent et pilis cervinis variegatum, antice vitta longitudinali sat angusta et acuminata crebre flavido-cervino-pilosa ornatum, subtus crebre obscure cervino-pubescent, sed prope mamillas nigrum. Laminae fusco-rufulae, pars labialis fere nigra. Sternum pallide fusco-rufulum. Chelae longae, rufulae, laeves, parce crinitae, margine inferiore sulci dentibus trinis subcontiguis, medio paulo majore, armato. Pedes longi (antici posticis evidenter longiores) fusco-rufuli, tenuissime longe et crebre setosi et fimbriati, tibiis anticis aculeis tennibus inferioribus 3—3, medianis longioribus, aculeoque laterali interiore parvo prope apicem sito, metatarsis aculeis validioribus 2—2 apicalibusque minoribus trinis armatis. Pedes postici numerose aculeati, sed tibiis aculeo dorsali unico, in dimidio apicali sito, munitis. Pedes-maxillares pallide fusco-rufuli, tarso obscuriore, femore supra 1—1—3 aculeato, patella tibiaque muticis, circiter aequilongis, tarso angusto, tibia vix latiore, longe acuminato et bulbum multo superante, bulbo parvo, subrotundo, apophysi apicali nigra, obliqua et oblique truncata, munito.

Stat. 103, Guildford; Stat. 109, Subiaco N.

♀. (*Tricca* E. SIMON, typus *L. japonica* E. S.)

### *Lycosa Phegeia* n. sp.

♂. Long. 8 mm. Cephalothorax fulvo-rufulus, parce cinereo albidoque pilosus, vitta marginali sat angusta crebrius albido-pilosa cinctus, area



oculorum in medio nigricanti. Oculi antichi in lineam leviter recurvam, paulo latiore quam oculorum ser. 2<sup>ae</sup>, inter se fere aequidistantes, medii lateralibus saltem  $\frac{1}{3}$  majores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> remotiores. Oculi ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo saltem duplo minore inter se separati. Abdomen supra fusco-nigricans, in medio cinereo-olivaceo, in lateribus albedo-pilosum, antice vitta longitudinali brevi testacea, utrinque punctis minutissimis albo-pilosis 3- vel 4-seriatis notatum, subtus fulvo-cinereum, in medio paulo obscurius et confuse vittatum, albedo-pilosum. Chelae validae et convexae, rufulae, nitidae, parce setosae, margine inferiore dentibus trinis, basali reliquis minore (interdum in chela sinistra dentibus quatuor apicali minutissimo). Partes oris fusco-castaneae. Sternum pedesque fulvo-rufula, pedes versus extremitates leviter obscuriores et ferruginei, robusti, tenuissime et longe setosi, tibia 1<sup>i</sup> paris aculeo inferiore gracili unico submedio, ad marginem interiorem sito, apicalibusque parvis binis armata, tibia 2<sup>i</sup> paris subtus similiter aculeata, sed aculeo laterali parvo interiore subapicali munita, metatarsis quatuor anticis aculeis inferioribus validioribus 2—2, apicalibusque minoribus trinis armatis, pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeo dorsali, in dimidio apicali sito, munitis. Pedes-maxillares sat graciles, fulvo-rufuli, tarso apice infuscato.




Fig. 8. *Lycosa Phcega* n. sp. Plaga genitalis feminae.

♀. Long. 9—10 mm. A mari differt magnitudine majore, oculis anticis in lineam subrectam, pedibus brevioribus, tibia 1<sup>i</sup> paris aculeis inferioribus submediis binis interiore longiore apicalibusque parvis, tibia 2<sup>i</sup> paris aculeis medianis parvis aequis, apicalibus aculeoque laterali interiore subapicali, munitis. Plaga genitalis circiter aequae longa ac lata, obtuse quadrata, in medio sulcata, in dimidio anteriore fovea fulva, ovato-transversa, saepe cordiformi vel obtuse triquetra impressa.

Stat. 123, Cannington.

Section III (sectio nova). Chelarum margo inferior quadridentatus, dente apicali denteque basali reliquis minoribus (typus *L. meracula* E. S.).

### *Lycosa meracula* n. sp.

♂. Long. 10 mm. Cephalothorax pallide fulvo-rufulus, area oculorum nigra, parte cephalica postice minute fusco-binotata, thoracica linea marginali tenui lineolisque radiantibus exillimis et abbreviatis fuscis, notata, albedo-flavescenti-pubescent, vitta marginali lata et linea media thoracica angustiore niveo-pilosis ornatus. Oculi antichi in lineam subrectam, oculorum linea secunda circiter aequilatam, inter se fere aequidistantes, medii lateralibus fere duplo majores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> paulo remotiores. Oculi ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo vix  $\frac{1}{4}$  angustiore

inter se separati. Abdomen fulvo-testaceum, superne albido-cinereo-pubes-  
cens, praesertim antice flavido-tinctum, antice linea media tenni, medium  
parum superante, utrinque maculis parvis seriatis niveo-pilosis ornatum,  
subtus omnino albido-pubescent. Chelae longae, fulvo-rufulae, ad basin et  
extus parum dense albo-pilosae. Partes oris obscure fulvae, ad basin in-  
fuscatae. Sternum luteo-olivaceum, albo-pilosum. Pedes sat longi et ro-  
busti, sed metatarsis tarsisque gracilibus, pallide lutei, versus extremitates  
rufulo-tincti, albido-pilosi, parce tenuiter et longe setosi, tibiis anticis  
aculeis inferioribus 3—3, medianis reliquis longioribus, et utrinque latera-  
libus parvis binis, metatarsis haud vel vix scopulatis, aculeis inferioribus  
longis 2—2, utrinque aculeo laterali simili et apicalibus binis multo mino-  
ribus subgeminatis armatis. Pedes postici numerose aculeati, patellis  
utrinque uniaculeatis, tibiis aculeo dorsali, paulo pone medium sito, munitis.  
Pedes-maxillares lutei et albo-pilosi, tarso obscuriore et castaneo, femore  
supra 1—3 aculeato, patella tibiaque circiter aequilongis, muticis, parce et  
longe setosis, tarso parvo tibia haud vel vix latiore, longe acuminato, bulbo  
ovato nigro-fusco.

♀ (pullus). A mari differt oculorum linea antica linea 2<sup>a</sup> paulo an-  
giore, oculis ser. 2<sup>ae</sup> majoribus, abdomine superne pallide testaceo, albo-  
marmorato et leviter fusco-variegato subreticulato, pedibus brevioribus, tibiis  
anticis aculeo laterali interiore munitis, sed exterioribus carentibus, pedibus-  
maxillaribus luteis, apice tarsi minute nigro.

Stat. 5, Denham, ad litus in detritu; Stat. 65, Albany.

### Gen. *Pardosa*.

#### *Pardosa praevelox* n. sp.

♀. Long. 18 mm. Cephalothorax nigellus, nigro cervinoque pubescens,  
parte cephalica lineis tenuissimis trinis, media usque ad oculos anticos  
ducta et pone oculos posticos leviter dilatata, lateralibus antice divaricatis,  
parte thoracica vitta media angusta, linea marginali, linea submarginali  
flexuosa et interrupta, lineolisque radiantibus vix expressis, albo-pilosis  
decoratus. Oculi antici in lineam procurvam, medii lateralibus paulo ma-  
jores et inter se quam a lateralibus vix remotiores, laterales a margine  
clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> saltem duplo remotiores. Oculi magni  
ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo aequilato vel paulo latiore inter se distantes. Abdomen  
oblongum, supra nigellum et testaceo-guttulatum, vitta media nigerrima  
lata integra, valde crenulato-dentata, late et confuse albido-testaceo-limbata,  
ornatum, subtus albidum, crebre et sat longe albo-pilosum, minutissime et  
parcissime cinereo-atomarium. Chelae validae et longae, nigrae, usque ad  
apicem crebre pallide-flavescenti-hirsutae, margine inferiore sulci dentibus  
validis subaequis trinis armato. Partes oris fusco-rufulae, laminae ad apicem



dilutiores. Sternum pallide luteum, longe albo-pilosum, anguste fusco-olivaceo-marginatum. Pedes fusco-rufuli, cinereo-albido-pilosi et nigro-hirsuti, femoribus anticis subtus obscurioribus et subvittatis, tibiis aculeis inferioribus 3—3, apicalibus minoribus, atque intus aculeis lateralibus binis, metatarsis aculeis inferioribus 2—2 armatis. Pedes postici anticis multo longiores, metatarsis tarsisque gracilibus. Fovea genitalis paulo longior quam latior, antice truncata, postice leviter attenuata atque obtusa, septo nigro sat lato et leviter lanceolato, tenuiter et acute carinato, divisa.

Stat. 114, Buckland Hill prope North Fremantle.

Species magnitudine magna insignis.

### Gen. *Artoria*.

#### *Artoria flavimanus* n. sp.

♀. Long. 8 mm. Cephalothorax niger, vitta media lata et ovata, sed in parte thoracica angustiore et attenuata vittaque marginali dilutioribus rufescentibus et albo-pilosis, notatus. Oculi antiqui in lineam valde procurvam, medii paulo majores, leviter prominuli et a lateralibus quam inter se paulo remotiores, laterales a margine clypei quam ab oculis ser. 2<sup>ae</sup> remotiores. Oculi magni ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo latiore inter se distantes. Abdomen supra nigrum, nigro cinereoque pubescens, antice vitta longitudinali angusta et abbreviata, paulo dilutiore et albido-pilosa, notatum, subtus fulvum confuse nigricanti-marginatum, parcissime et minute fusco-atomarium,



Fig. 9. *Artoria flavimanus* n. sp.  
Plaga genitalis feminae.

crebre cervino-flavido-pubescens. Chelae validae, fusco-rufulae, nitidae, parce setosae, margine inferiore sulci dentibus validis trinis, basali paulo minore, armato. Partes oris nigricantes, apice sensim dilutiores. Sternum coxaeque fulvo-olivacea. Pedes sat longi, metatarsis tarsisque gracilibus, haud scopulatis, obscure fusci, femoribus dilutioribus, valde et sinuose nigro-annulatis et sublineatis, tibiis confuse vittatis, tarsis metatarsis paulo

dilutioribus, tibiis quatuor anticis aculeis inferioribus debilibus 2—2 apicalibus binis minoribus aculeoque laterali interiore, in dimidio apicali sito, metatarsis aculeis inferioribus validioribus 2—2 apicalibusque minoribus trinis armatis. Pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeis dorsalibus binis debilibus munitis. Pedes-maxillares luteo-flavidi, versus extremitates olivaceo-tincti. Plaga genitalis magna, latior quam longior, leviter rugosa et plicata, fusco-rufula, utrinque sensim nigra, fovea media latiore quam longiore, leviter angulosa, in fundo striata et postice plagula rufo-nitida sat anguste transversa munita.

Stat. 101, Mandarin Weir.

*Artoria cingulipes* n. sp.

♀. Long. 6 mm. Cephalothorax niger, utrinque parcissime albido-pilosus, vitta media lata sed postice acuminata, paulo dilutior, ferruginea et albido-cervino-pilosa notatus. Oculi antici in lineam valde procurvam, parvi et subaequales, medii a lateralibus quam inter se vix remotiores, laterales a margine clypei quam inter se haud vel vix remotiores. Oculi magni ser. 2<sup>ae</sup> spatio oculo vix angustiore inter se distantes. Abdomen supra fuscum, nigro-maculatum et postice nigro-accentuatum, nigro-cervinoque pubescens et parce albo-pilosum, in dimidio basali vitta longitudinali angusta, obscure fulva et flavido-pilosa notatum, subtus obscure fulvo-testaceum, leviter fusco-variegatum, parce fulvo-cervino-pilosum. Pedes fusco-olivacei, femoribus subtus dilutioribus, fulvis et late nigro-triannulatis, tibiis metatarsisque annulo medio angusto fulvo et flavescenti-piloso cinctis, setis tenuibus et longis conspersi, tibia 1<sup>i</sup> parvis aculeis inferioribus 2—2 debilibus et longis (praesertim interioribus), apicalibus binis minoribus et laterali inferiore, in dimidio apicali sito, tibia 2<sup>i</sup> parvis aculeis inferioribus tantum binis uniseriatis, ad marginem exteriorem sitis, setaeque submedia interiore, metatarsis aculeis inferioribus validioribus 2—2 apicalibusque parvis trinis armatis. Pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeo dorsali, in dimidio apicali sito, munitis. Pars labialis nigra, laminae fuscae, apice dilutiores. Sternum coxaeque fulvo-olivacea nitida. Chelae robustae, fuscae, nitidae, parce setosae, margine inferiore sulci dentibus trinis, basali reliquis, inter se aequis, minore. Pedes-maxillares fulvi, tibia tarsoque valde infuscatis. Plaga genitilis nigra, fovea maxima transversa utrinque leviter attenuata et subangulosa, plagulam subquadratam sed antice excisam, leviter convexam, nitidam et fulvo-olivaceam, fere omnino obtegente, impressa.

Stat. 137, Collic.



Fig. 10. *Artoria cingulipes* n. sp. Plaga genitilis feminae.

*Artoria taeniifera* n. sp.

♀. Long. 5 mm. Cephalothorax niger, utrinque longe et parce albido-pilosus, vitta media lata sed postice acuminata, paulo dilutior et crebre fulvo-rubro-pilosa, notatus. Oculi ut in praecedenti. Abdomen supra nigrum et nigro-pubescens, in lateribus parce albo-pilosum, vitta media integra lata sed postice sensim attenuata et leviter crenulata fulva, fulvo-rufulo-pilosa vittam interiorem fuscam includente et antice linea tenui albo-pilosa secta, ornatum, subtus fulvo-olivaceum, leviter fusco-maculatum, parum dense albido-pilosum. Pedes obscure fulvi, late fusco-annulati, setis tenuibus et longis conspersi et parce albido-pilosi, ut in praecedenti

aculeati. Pars labialis nigra, laminae fuscae ad apicem sensim dilutiores. Sternum olivaceum, versus marginem sensim obscurius, nitidum. Chelae



Fig. 11. *Artoria taeniiifera* n. sp.  
Plaga genitales feminae.

validae, fusco-rufulae et nitidae, parce cinereo-setosae, margine inferiore sulci dentibus binis aequis, denteque ultimo (basali) minutissimo, vix perspicuo, armato. Pedes-maxillares fulvi, apice infuscati. Plaga genitales semicircularis, nigra, rugosa et pilosa, sed postice nitida et minute emarginata, fovea superficiali rufula sat parva et subtriquetra, postice acuta, impressa.

Stat. 142, Bunbury.

## Fam. Oxyopidae.

### Gen. *Oxyopes*.

Cel. W. MICHAELSEN et R. HARTMEYER specimina multa sed cuncta valde immatura hujus generis collegerunt.

## Fam. Salticidae.

### Salticidae pluridentati.

#### Astieae.

#### Gen. *Astia*.

#### *Astia tristicula* n. sp.

♀. Long. 3—3,5 mm. Cephalothorax subtilissime coriaceus sed nitidus, niger, parte thoracica in medio paulo dilutiore et ferruginea subvittata, cephalica, saltem utrinque (fere omnino depili) fulvo-rubro-pilosa, thoracica parce et longe albo-pilosa. Oculi antici inter se subcontigui et valde inaequales, medii maximi, pilis obscure rubris cincti. Oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> ab oculis posticis quam a lateralibus anticis evidenter remotiores. Clypeus subglaber, ad marginem setis cinereis paucis uniseriatis munitus. Abdomen nigellum supra, parce obscure testaceo-atomarium et albido-pilosum. Chelae validae, sublaeves et subglabrae, nigro-nitidae, margine inferiore sulci dentibus contiguus 6 vel 7, basin versus sensim minoribus, armato. Partes oris sternumque nigra, laevia. Pedes 1<sup>i</sup> paris nigri, tarso fulvo-rufulo, metatarso tibiaque saepe fulvo-variegatis, reliqui pedes obscure fulvo-rufuli, femoribus ad maximam partem nigris, patellis tibiisque nigro-annulatis interdum omnino infuscatiss, tibia 1<sup>i</sup> paris aculeis inferioribus validis et longissimis pellucetibus 3—3 aculeisque lateralibus interioribus binis similibus, metatarso, tarso vix longiore, aculeis longis 2—2, subtus armatis.

pedes postici, aculeis parvis apicalibus metatarsorum exceptis, mutici. Pedes-maxillares graciles, lutei, femore ad basin infuscato, tibia tarsoque nigris sed niveo-hirsutis. Fovea genitalis subrotunda, carinula latissima et plana fulvo-nitida, parallela vel leviter lanceolata, divisa.

Ab *A. haviola* L. KOCH pedibus multo brevioribus, anticis fere omnino nigris, pictura cephalothoracis abdominisque multo simpliciore et structura genitali abunde differt.

Stat. 109, Subiaco N.; Stat. 142, Bunbury; Stat. 146, Boyanup.

### Gen. *Helpis*.

#### *Helpis occidentalis* n. sp.

♀. Long. 4 mm. Cephalothorax laevis, fulvo-rufulus, utrinque vitta submarginali lata, in parte cephalica intus, secundum oculos, obtuse ampliata, in thoracica postice leviter attenuata, notatus, albido-pilosus (fere depilis). Pili oculorum laete rubri, pili clypei crassi et breves albi. Abdomen longe ovatum, depressiusculum, superne nigricans, pilis albis rubrisque minutis vestitum, vitta media integra lata sinuoso-angulata, paulo dilutiore sed nigro-marginata, ornatum, subtus pallide testaceum, regione epigastri fulvo-rufula, regione ventrali vitta media latissima sed postice sensim attenuata notatum, omnino albo-cinereo-pilosum. Mamillae fulvae. Chelae breves et latae, fusco-castaneae, opacae et subtiliter transversim striatae, parce albo nigroque crinitae, margine superiore sulci dentibus parvis 5 inter se late sed inaequaliter distantibus, inferiore dentibus 5, 1<sup>o</sup> (apicali) singulariter sito, reliquis contiguis et versus basin sensim minoribus, armatis. Partes oris fusco-castaneae, testaceo-marginatae. Sternum fulvo-olivaceum, laeve et nitidum. Pedes quatuor antici robusti, obscure fulvo-rufuli, coxis femoribus ad basin tarsisque dilutioribus, femoribus patellis tibiisque utrinque infuscatis et subvittatis, sed tibiis annulo apicali paulo dilutiore et crasse albo-piloso ornatis, pedes quatuor postici multo graciliores, lutei femoribus ad apicem anguste infuscatis, femoribus cunctis aculeis dorsalibus binis uniseriatis, longis et prope apicem aculeo laterali interiore vel aculeis lateralibus binis armatis, tibiis quatuor anticis aculeis inferioribus validis, longis, pronis et singulariter minute elevatis 3—3, metatarsis, tibiis brevioribus, aculeis similibus 2—2 subtus armatis, tibiis metatarsisque posticis aculeis minoribus conspersis. Pedes-maxillares pallide fulvi, tibia tarsoque setis albis longis fimbriatis, tibia patella longiore. Area genitalis fusco-rufula, fovea superficiali longiore quam latiore, antice valde attenuata, carinula tenui sed postice valde ampliata, omnino divisa.

Stat. 103, Guildford; Stat. 162, Torbay.

Ab *H. (Astia) respersa* et *minitabunda* L. KOCH, ex Australia occidentali, differt imprimis magnitudine majore, pedibus anticis brevioribus et robustioribus, aculeis seriatis tibiis et metatarsorum multo validioribus, pilis oculorum rubris clypei albis, regione ventrali vitta latissima nigricanti notata.

***Adorotoma* nov. gen.**

Genus sat ambiguum, fere inter *Astiam* et *Rogmocryptam*, ab *Astia* differt cephalothorace inter oculos posticos laud impresso, parte thoracica in declivitate stria minutissima et remotissima (ad oculos posticos atque ad apicem fere aequidistante) impressa, chelarum margine inferiore longe obliquo, dentibus binis subaequis, inter se distantibus, armato, pedibus anticis robustis, tibiis metatarsisque similiter aculeatis sed patellis intus uniaculeatis, pedibus posticis omnino muticis. A *Rogmocrypta* praesertim differt cephalothorace stria parva impresso, laminis-maxillaribus angustis et longis ut in *Astia*, pedibus anticis robustis et valde aculeatis etc.

***Adorotoma nigro-olivacea* n. sp.**

♀. Long. 3 mm. Cephalothorax niger, parte thoracica vix dilutiore et obscure rufulo-tincta, glaber, opacus, omnino crebre et subtiliter coriaceo-rugosus, clypeo angustissimo fere nudo. Oculi antici magni, inter se subcontigui, apicibus in lineam subrectam. Oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> fere in medio, inter laterales anticos et posticos siti. Abdomen breviter ovatum, convexum, atro-testaceum, pilis albidis sat longis conspersum. Chelae breves et latae, antice nigro-nitidae. Partes oris sternumque fusco-olivacea, laevia. Pedes fusco-olivacei, femoribus fere nigris, coxis tarsisque dilutioribus, trochantere 4<sup>i</sup> paris luteo, pedes 1<sup>i</sup> paris femore compresso et claviformi, patella intus ad marginem interiorem aculeis subapicalibus binis, tibia subtus aculeis validis et longis, singulariter elevatis 5—5 (apicalibus minoribus), metatarso brevi aculeis similibus 2—2 (basali apicem articuli paulo superante, apicali apicem tarsi fere attingente), pedes 2<sup>i</sup> paris tibia aculeis paulo debilioribus 4—4, metatarso aculeis 2—2 armatis. Pedes-maxillares graciles et longi, fusco-olivacei femore paulo dilutiore. Area genitalis leviter convexa, nigro-nitida, fovea magna subrotunda vel obtuse quadrata, in fundo carinula humili et tenui ad partem divisa.

Stat. 137, Collie.

***Adorotoma chionopogon* n. sp.**

♀. Long. 3 mm. Ab *A. nigro-olivacea*, cui subsimilis est, differt clypeo basique chelarum pilis albis iniquis, nonnullis longis, vestitis, abdomine nigro, superne pilis albis, brevibus et depressis, acute lanceolatis, consperso,

pedibus fulvis, femore 1<sup>i</sup> paris nigro rarius superne fulvo-vittato, reliquis femoribus utrinque nigro-vittatis, patella tibia metatarsoque 1<sup>i</sup> paris infuscatis sed patella ad basin tibiaque ad apicem luteo-annulatis, pedibus posticis saepe subvittatis, fovea genitali minore, longiore quam latiore et subparallela, carinula nigra et acuta, postice in plagulam magnam obtuse triquetram ampliata, omnino divisa.

Stat. 98, Wooroloo; Stat. 99, Lion Mill.

## Salticidae unidentati.

### Saiteae.

#### Gen. *Saitis*.

#### *Saitis Michaelseni* n. sp.

♀. Long. 4 mm. Cephalothorax nigro-fuscus, parte cephalica nitida, fulvo-rubro-pilosa et nigro-crinita, thoracica parcius pilosa et vittis radiantibus confusis longius et albidius pilosis notata, vitta submarginali luteo-testacea et albo-pilosa cinctus. Oculi antichi smaragdinei, in lineam rectam seu levissime recurvam, laterales a mediis bene separati. Pili oculorum cinereo-fulvi, sub oculis mediis albidis. Clypeus parce cinereo-fulvo-barbatus atque ad marginem setis albis longis paucis fere uniseriatis munitus. Abdomen supra fusco-testaceum, obscure fulvo-guttulatum et substriatum, vitta media nigricanti, in dimidio apicali acuminata et lineolis albis interruptis marginata, notatum, fulvo albidoque pilosum (fere omnino depile), subtus pallide cinereo-testaceum, parcissime fusco-punctatum et lineolis binis sinuosis et abbreviatis fuscis notatum. Chelae parvae, nitidae, fulvo-rufulae, pars et longe albo-crinitae. Partes oris sternumque obscure fulvo-olivacea, pars labialis fere nigra, sternum nitidum, parce albo-crinitum. Pedes lutei, coxis obscurioribus, longe et inaequaliter cinereo-setosi, tibia 1<sup>i</sup> paris subtus aculeis gracilibus et sat longis 3—3, apicalibus minoribus, et intus aculeis lateralibus similibus binis, metatarso aculeis inferioribus validioribus et longioribus 2—2 et utrinque lateralibus paulo minoribus binis, pedes 2<sup>i</sup> paris similiter aculeati sed tibia aculeo laterali exteriori parvo submedio munita. Pedes postici numerosse aculeati, tibiis aculeis inferioribus, lateralibus aculeoque dorsali subbasilari, metatarso 3<sup>i</sup> paris aculeis longis biverticillatis, metatarso 4<sup>i</sup> paris aculeis triverticillatis armatis. Pedes 3<sup>i</sup> paris (feminae) pedibus 4<sup>i</sup> paris evidenter breviores. Pedes maxillares lutei. Plaga genitalis paulo latior quam longior, nitida, fulva fuscave, septo angusto, in medio sensim attenuato, omnino divisa, utrinque leviter convexa et foveola parva, semicirculari, impressa.

Stat. 146, Boyanup.



A *S. (Prostheclina) pallida* KEYSERL. ex Australia orientali et septentrionali sat affinis sed pictura abdominis omnino alia.

***Saitis Michaelseni obscurior* n. subsp.**

♀. Abdomen supra nigricans, tantum ad marginem testaceo-guttulatum, postice haud vittatum, cervino-rubro-pubescent et punctis parvis niveo-pilosis conspersum. Pedes obscure fulvi subannulati, coxis femoribusque ad basin dilutioribus. Pedes-maxillares lutei, nigro-notati.

Stat. 109, Subiaco N.; Stat. 123, Cannington.

***Saitis heteropogon* n. sp.**

♀. Long. 2.5 mm. Cephalothorax niger, nigro-pubescent et pilis paucis fulvis conspersus, linea media, antice acuminata et medium partis cephalicae attingente, niveo-pilosa decoratus. Oculi antici apicibus in lineam plane rectam, laterales a mediis anguste separati. Pili oculorum fulvo-rubri; sub oculis mediis albidis, clypeus sub oculis fulvo-albido- ad marginem cinereo-rubro-barbatus, in medio pilis longioribus paucis albis munitus. Abdomen supra nigerrimum, vitta media integra, in medio paululum ampliata, postice leviter dentata, niveo-pilosa atque in medio pilis rubris mixta, ornatum, utrinque, saltem antice, linea tenui albo-pilosa marginatum, subtus in medio late dilutius et obscure testaceum. Chelae parvae, nigro-nitidae, parce et longe albo-crinatae. Partes oris sternumque nigra, hoc nitidum parce albo-crinatum. Pedes obscure fulvi valde nigro-variegati et annulati, partibus fulvis niveo-pilosis, fere ut in praecedenti aculeati. Pedes 3i paris pedesque 4i paris circiter aequilongi. Pedes-maxillares fulvo nigroque annulati, albo-crinati. Plaga genitalis magna, fusco-nitida, latior quam longior, utrinque costa parva tenui, oblique divaricata et apice uncata, munita.

Stat. 148, Busselton.

**Marpisseae.**

**Gen. *Breda*.**

***Breda jorialis* (L. Koch).**

*Marptusa j.* L. KOCH, Arachn. Austr., II, 1880, p. 1109, tab. XCH, fig. 1—2.

Stat. 99, Lion Mill.

Species in Australia occidentali et australi etiam occurrit.

**Gen. *Holoplatys*.**

***Holoplatys planissima* (L. Koch).**

*Marptusa planissima* L. KOCH, loc. cit., II, 1880, p. 1100, tab. XCVI, fig. 4—5.

Stat. 95, Boorabbin.

Haec species valde diffusa est per Australiam totam, Tasmaniam, ins. N.-Caledoniam et sec. THORELL in ins. Sumatra (*H. planissima occidentalis* TH.).

***Holoplatys quinquecingulata* n. sp.**

♀. Long. 5 mm. Cephalothorax planissimus et longus, tenuiter coriaceus et parcissime albo-pilosus, parte cephalica haud impressa, thoracica in medio paulo laeviore, impressione superficiali recurva lineolisque radiantibus punctatis parum expressis munita. Oculi antici valde iniqui et contigui, medii smaragdinei, pilis albis et obtusis uniseriatis circumdati. Abdomen longissimum, valde depressum, supra nigellum, vittis transversis latis albo-testaceis quinque ornatum: vitta penultima (4<sup>a</sup>) sinuose dentata, reliquis subrectis, minute et parcissime albido-setosum, subtus pallide flavidum, utrinque nigro-marginatum. Chelae minutissimae, remotae, fuscae, coriaceae. Partes oris sternumque nigro-olivacea, sternum sublaeve, obtuse marginatum. Pedes 1i paris robustissimi, femore claviformi rubro-castaneo et supra et subtus nigro-vittato, subtiliter coriaceo et parce albo-piloso, patella fusca, tibia nigra subtilius coriacea, apicem versus attenuata, mutica, metatarso brevi, tarso haud longiore, subtus ad marginem anteriorem aculeis brevibus suberectis binis armato, pedes 2i paris robusti, sed multo minores, obscure fulvi, coxa nigra, tibia leviter infuscata, metatarso minute biaculeato, pedes postici multo graciliores, omnino mutici, lutei, femore 4i paris infuscato, patella tibiaque apice tenuiter nigro-cinctis. Pedes-maxillares albi, femore ad basin minute olivaceo. Plaga genitalis longior quam latior et subparallela, in dimidio anteriore fovea subquadrata, antice emarginata et septo rufulo omnino divisa, impressa, in dimidio altero fulvo-rufula late et confuse impressa.

Stat. 76, Day Dawn.



Fig. 12. *Holoplatys quinquecingulata* n. sp.  
A Abdomen supra visum.  
B Plaga genitalis feminae.

***Holoplatys fractivittata* n. sp.**

♀. Long. 5 mm. A praecedenti, cui subsimilis est, differt abdomine vittis albidis inter se valde dissimilibus, 1<sup>a</sup> recurva utrinque dentata, 2<sup>a</sup> angusta tripartita, parte media arcuata, 3<sup>a</sup> et 4<sup>a</sup> latis et sinuose dentatis, ultima tenni minute tripartita, subtus albido-flavido, latius nigro-marginato, plaga genitali in dimidio anteriore fovea subrotunda, haud carinata et utrinque tuberculum nigrum parvum et subrotundum includente, impressa, in dimidio altero rufula, convexa et subtilissime transversim striata.




Fig. 13. *Holoplatys fractivittata* n. sp.  
A Abdomen supra visum.  
B Plaga genitalis feminae.

Stat. 82, Moonyoonooka; Stat. 102, Midland.

Species duae ab *H. planissima* L. KOCH parte cephalica haud impressa, abdomine supra transversim albo-vittato, metatarsis quatuor anticis subtus aculeis parvis erectis binis uniseriatis tantum armatis, abunde differunt.

### Gen. *Ocrisiona*.

#### *Ocrisiona leucomis* (L. Koch).

*Marptusa l.* L. KOCH, Arachn. Austr., II, 1879, p. 1096, tab. XCVI, fig. 1—2.

Stat. 103, Guildford; Stat. 129, Jarrahdale; Stat. 142, Bunbury.

Species vulgarissima per Australiam orientalem et septentrionalem etiam, sec. L. KOCH, in N.-Zealandia et insula Pelew dicta.

### Gen. *Muziris*.

#### *Muziris carinatus* n. sp.

♀. Long. 7 mm. Cephalothorax niger, opacus, subtiliter et crebre coriaceus, sat longe et parce albo-pilosus. Oculi antici inter se subcontigui, apicibus in lineam subrectam, medii virides, pilis albido-flavescentibus cincti. Oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> paulo ante medium, inter oculos posticos et laterales anticos, siti. Clypeus sub oculis setis crassis et longis albido-luteis, vittam angustam designantibus, atque ad marginem setis albis tenuioribus et longioribus uniseriatis ornatus. Abdomen longe oblongum, nigrum, parce albido-luteo-pubescent, superne punctis minutissimis biseriatis 5—5 niveo-pilosis ornatum. Partes oris sternumque nigra, hoc nitidum, parce et longe albo-crinatum. Chelae validae, nigro-aeneae et subglabrae, valde rugosae et transversim plicatae. Pedes modice longi, antici robusti, femoribus compressis, fusco-castanei, femoribus coxisque nigris, patellis, tibiis metatarsisque anticis ad basin dilutioribus et laete rubris, tarsis anticis fulvo-rufulis, posticis apice luteis, cuncti parce albo-pilosi et longe cinereo-hirsuti, tibiis anticis aculeis brevibus sed robustis et suberectis 3—3, interioribus paulo validioribus, metatarsis tarsis haud longioribus, aculeis majoribus 2—2 subtus armatis. Pedes postici tibiis aculeis inferioribus subbasilaribus parvis binis apicalibusque binis similibus, metatarsis aculeis apicalibus verticillatis exceptis, mutici. Pedes-maxillares longi, nigri, patella ad basin ferruginea, albo-pilosi et hirsuti. Fovea genitalis magna, latior quam longior, utrinque rotunda, carinula nigro-nitida, tenui sed postice sensim ampliata et longe triquetra, omnino divisa.

Stat. 98, Woeroloo.

A *M. (Acompse) calvipalpi* L. KOCH et *M. (Marptusa) Doleschalli* THORELL magnitudine multo minore, pictura cephalothoracis abdominisque simpliciore valde differt.

Gen. *Clynotis*.*Clynotis viduus* (L. Koch).

*Idius* v. L. KOCH, Arachn. Austr., 1879, p. 1129, tab. XCVIII, fig. 4—5.

Stat. 160, Cranbrook.

Etiam in Australia occidentali et septentrionali atque in Tasmania occurrit haec species.

*Clynotis albopictus* n. sp.

♀. Long. 6 mm. Cephalothorax sat longus, niger, sublaevis, sat crebre nigro-crinitus et, praesertim in parte thoracica, minute et parce albo-pilosus. Oculi antici apicibus in lineam evidenter recurvam, laterales a mediis bene sejuncti, pilis albis sat brevibus cincti. Oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> fere in medio, inter oculos posticos et laterales anticos, siti. Clypeus parce et longe albo-barbatus. Abdomen longe oblongum, supra atrum, minute et parce albido-pilosum, subtus obscure fulvo-testaceum, cinereo-luteo-pubescens. Partes oris sternumque nigra, hoc nitidum, longe albo-crinitum. Chelae validae, nigro-castaneae, parce et minute granulosae et transversim striatae, sed ad apicem sublaeves. Pedes modice longi, antici robusti femoribus compressis, nigri, femoribus cunctis ad basin coxisque posticis dilutioribus et ferrugineis, metatarso 4<sup>i</sup> paris annulo medio obscure rufulo cinctis, parce albido-pilosi et cinereo-hirsuti, antici maculis parvis niveo-pilosis supra ornati, tibiis aculeis inferioribus validis et minute prominulis 2—2, interioribus paulo longioribus, metatarsis, tarsis paulo longioribus, aculeis validioribus et longioribus 2—2 subtus munitis. Pedes postici valde aculeati, tibiis aculeis lateralibus, metatarsis aculeis subbasilaribus, submedianis apicalibusque armatis. Pedes-maxillares graciles et sat longi, fusco-castanei, tarso nigro, nigro-criniti et albo-pilosi. Plaga genitalis magna, leviter convexa et rugosa, latior quam longior, postice truncata, nigra et obtuse sulcata, antice attenuata, fulvo-testacea et foveolata.

Stat. 136, Harvey; Stat. 142, Bunbury.

A *C. (Idio) semiatro* L. KOCH verisimiliter sat affinis.

## Aelurilleae.

Gen. *Habrocestum*.*Habrocestum chrysomelas* n. sp.

♂. Long. 4 mm. Cephalothorax niger nigro-pubescens, pilis oculorum fulvo-rufulis, clypeo sat lato et retro-obliquo fere nudo, parce setoso. Oculi antici virides, inter se appropinquati, apicibus in lineam subrectam. Area

oculorum superne visa fere parallela et postice cephalothorace non multo angustior. Oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> in medio (vel vix pone medium) inter laterales anticos et posticos siti. Abdomen breviter ovatum, supra splendide viridi violaceoque micanti-squamulatum et vittis binis parallelis latis et ovatis, tertiam partem apicalem attingentibus, nigerrimis et opacis, decoratum, subtus atro-testaceum et crebre niveo-pubescent. Chelae sat angustae et parallelae, nigrae, glabrae et sublaeves, margine inferiore sulci dente parvo et acuto parum remoto armato. Partes oris nigrae, laminae latae, extus ad angulum prominulae. Sternum nigrum, nitidum, longe albo-pilosum. Pedes quatuor antici breves et crassi, nigri, tarsis paulo dilutioribus, parce albo-pilosi. Pedes 3i paris pedibus 4i paris multo longiores, nigri sed metatarso (basi excepto) tarsoque fulvis et crasse niveo-pilosis. Pedes 4i paris femore nigro, reliquis articulis fulvo-rufulis et fusco-annulatis, cuncti longe et numerose aculeati. Pedes-maxillares breves et robusti, nigri, femore ad apicem, patella tibia tarsoque supra crasse albo-flavescenti-pilosis, femore robusto curvato et compresso, patella laud vel vix longiore quam latiore, tibia brevi, extus ad angulum apophysi gracillima fere setiformi, acuta et curvata armata, tarso sat longe ovato et curvato, bulbo longe ovato, ad basin obtusissime turbinato et retro-producto.

Stat. 99, Lion Mill.

*Habrocestum speculiferum* n. sp.

♂. Long. 4 mm. Cephalothorax niger, nigro-pubescent, utrinque, sub oculis posticis, pilis rufulis albisque paucis munitus, pilis oculorum et clypei crassis et densis roseo-aurantiacis, sed utrinque in gena et sub oculis mediis albis, clypeo lato leviter retro-obliquo. Oculi antici caerulei, inter se distincte separati, apicibus in lineam evidenter recurvam. Area oculorum superne visa parallela vel postice quam antice vix angustior et postice cephalothorace diametro oculo circiter angustior. Oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> fere in medio, inter oculos laterales anticos et posticos, siti. Abdomen breviter ovatum, nigrum, antice truncatum atque ad marginem setis albis longis paucis munitum, superne scuto duriusculo nigerrimo, glabro et nitido, tertiam partem apicalem paulo superante, obtectum, praeterea nigro-velutinum, subtus atro-testaceum et crebre niveo-pubescent. Chelae breves, parallelae, nigrae, apice paulo dilutiores, laeves et subglabrae, margine inferiore sulci dente sat parvo et acuto, parum remoto, armato. Partes oris nigrae, laminae latae, extus ad angulum prominulae et conicae. Sternum nigrum, nitidum, longe albo-pilosum. Pedes pallide lutei, metatarsis tarsisque anticis femoribusque posticis leviter obscurioribus, cuncti crasse niveo-pilosi, sed femoribus tibiisque anticis intus nigro-pilosis et subvittatis, pedes quatuor antici posticis breviores et robustiores, pedes 3i paris pedibus 4i paris multo

longiores, cuncti longe et numerose aculeati. Pedes-maxillares breves et robusti, albido-testacei, crebre et longe albo-hirsuti, femore robusto, compresso et arcuato, patella haud vel vix longiore quam latiore, tibia brevi, extus ad angulum apophysi nigra gracillima et recta armata, tarso sat longe ovato et curvato, bulbo magno, nigro et simplici, ad basin obtuse turbinato et retro-producto.

Stat. 115, North Fremantle.

## Hylleae.

### Gen. *Eugasmia*.

#### *Eugasmia chlorophthalma* n. sp.

♂. Long. 6 mm (fere omnino depilis). Cephalothorax crassus, niger, parte thoracica vix dilutior et leviter castanea, cephalica albo-pilosa et, saltem prope oculos, pilis fulvis munita, thoracica utrinque vitta submarginali, postice in declivitate, lineolis binis obliquis albo-pilosis notata. Pili oculorum longi albi, pili clypei omnino albi biseriati: pili suboculares longi, marginales crassi et breves. Oculi antichi laete smaragdinei, in lineam recurvam, laterales a mediis distinctissime separati. Oculi postici lateralibus anticis paulo minores. Oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> fere in medio, inter laterales anticos et posticos, siti. Abdomen breviter ovatum, supra cinereo-lividum, utrinque testaceo-atomarium et albo-pilosum, vitta media lata nigra cervino-pilosa (?) ornatum, subtus utrinque pallide testaceum, parce et minute nigro-punctatum et albo-pilosum, in medio late nigrum et cervino-pubescent, sed vitta media confusa paulo dilutior notatum. Pars labialis fere nigra, laminae rufescentes intus late dilutiores, apice valde ampliatae, extus ad angulum productae et conicae. Sternum obscure fuscum. Chelae sat breves, fere parallelae, antice fusco-rufulae, subglabrae et nitidae, sed versus medium subtiliter transversim striatae, margine inferiore sulci brevi, dente mediocri acuto armato. Pedes fusco-castanei, antichi fere nigri, coxis praesertim posticis, dilutioribus, tarsis luteis. Pedes 1<sup>i</sup> paris (tarso excepto) robustissimi, femore subclavato, subtus longissime et crebre nigro-fimbriato, tibia metatarsoque et supra et subtus pilis erectis nigris crassis et obtusis, sed tenuiter pediculatis, crebre cristatis, aculeis inferioribus 2—2 lateralibusque utrinque binis armatis. Pedes 2<sup>i</sup> paris minores, similiter aculeati, haud cristati. Pedes postici longe et numerose aculeati, metatarso 3<sup>i</sup> paris aculeis biverticillatis (verticillo basali ex aculeis quinque), metatarso 4<sup>i</sup> paris aculeis triverticillatis (apicalibus minoribus) armatis. Pedes-maxillares breves et robusti, pallide lutei, femore paulo obscuriore, longe et crebre albo-hirsuti, femore crasso et compresso, patella vix longiore quam latiore, tibia brevi, latiore quam longiore, extus ad apicem apophysi nigra gracillima



sed obtusa, antice directa et levissime incurva munita, tarso sat longe ovato, bulbo simplici, plano, ovato, leviter fusiformi, ad basin atque ad apicem acuminato.

Stat. 155. York.

Species tibiis metatarsisque anticis valde bicristatis, pilis clypei albis biseriatis, chelis maris antice subglabris a reliquis speciebus hujus generis Asiam et Australiam incolentibus eximie distincta, praeterea ab *E. hirsuta* KARSCH, ex ins. Philippinis, sat similis.

## Salticidae fissidentati.

### Servaeae.

#### Gen. *Servaea*.

#### *Servaea spinibarbis* n. sp.

♂. Long. 5 mm. Cephalothorax crassus, fusco-castaneus, prope oculos late niger, crebre et longe fulvo-cervino-pubescens, parte cephalica area magna subquadrata niveo-pilosa sed fulvo variegata oblecta, thoracica versus marginem parce albo-pilosa. Oculi antici in lineam evidenter recurvam, laterales a mediis bene sejuncti, pili oculorum supra et inter oculos laete fulvo-rubri, subtus albedo-fulvescentes, oculi parvi ser. 2<sup>ae</sup> ab oculis posticis quam a lateralibus anticis paulo remotiores. Clypeus oculis magnis circiter duplo angustior, spinis bacilliformibus obtusis setis longis mixtis albedo-fulvescentibus hirsutus. Abdomen nigellum, supra confuse testaceo-plagiatum, crebre et longe albedo fulvoque pilosum, vitta media nigra rufulo-pilosa et saepe utrinque, in dimidio apicali, macula aurantiaco-pilosa notatum, subtus pallide testaceum et macula media maxima obscuriore subquadrata notatum, sed omnino brevius albo-pubescens. Mamillae inferiores et mediae fulvo-olivaceae. superiores albedo-luteae, extus minute fusco-notatae. Chelae verticales, longae et sat angustae, subglabrae, nigrae et transversim rugatae, intus leviter depressae et emarginatae, sed ad apicem obtuse prominulae et dente brevi, crasso, sed acuto, antice directo, armatae, margine inferiore sulci dente aequaliter et acute fisso armato, ungue valido, simplici et rufulo. Partes oris obscure fuscae, laminae extus ad apicem prominulae, sed obtusae. Sternum parvum nigrum, crebre et longe albo-crinitum. Pedes sat longi, obscure fulvo-olivacei, femoribus dilutioribus, metatarsis, saltem posticis, confuse annulatis, cuncti albo-pilosi et hirsuti, tibiis anticis aculeis inferioribus sat longis sed debilibus trinis uniseriatis, ad marginem anteriorem sitis, extus aculeo laterali unico, intus aculeis lateralibus trinis armatis, sed aculeis dorsalibus carentibus, metatarsis tibiis non multo brevioribus, aculeis inferioribus 2—2 et utrinque

lateralibus binis armatis. Pedes postici numerose aculeati, tibiis aculeo dorsali subbasilari munitis. Pedes-maxillares fulvi, tarso infuscato, longe albo-hirsuti et fimbriati, femore compresso, patella subquadrata, tibia patella brevior, extus ad apicem apophysi fulva, subpellucens, articulo longiore, tenui, antice directa, subrecta, apice leviter incurva, instructa, tarso sat anguste ovato, depressiusculo et obtuso, bulbo ad apicem area depressa rotunda, stylo fulvo circumdata, munito, ad basin sub tibia producto, attenuato sed obtuso.

Stat. 109, Subiaco N; Stat. 113, Cottlesloe; Stat. 114, Buckland Hill prope North Fremantle; Stat. 115, North Fremantle; Stat. 116, East Fremantle, Recreation Ground; Stat. 118, Fremantle, caemetario.

A *S. vestita* L. KOCH sat affinis, sed multo minor.

## Triteae.

### Gen. *Opisthoneus*.

#### *Opisthoneus deverus* n. sp.

♂. Long. 4 mm. Cephalothorax crassus, laete rufescens, versus marginem valde infuscatus, parte cephalica maculis ocularibus latis et postice macula media, tuberculum humillimum includente, nigris, notata, fere laevis. pilis crassis et pronis flavis pilis aurantiacis mixtis crebre vestitus. Pili oculorum laete coccinei. Pili clypei longi et densi albido-flavi. Abdomen longe oblongum, supra fulvo-testaceum, maculis parvis fuscis biseriatis 3—3 notatum, pallide flavo-pubescent, utrinque in lateribus nigro-vittatum, subtus pallide testaceum et vitta nigra integra notatum. Sternum fulvo-nitidum, albo-pilosum. Chelae validae, sed attenuatae et divaricatae, antice rufulae, sed versus basin obscuriores et aeneo-tintae, glabrae et nitidae, sed subtilissime et parce transversim rugatae, intus, prope apicem, dente parvo et obtuso munitae, subtus convexae, laeves et nitidae, tuberculo carentes, margine inferiore sulci sat longo et obliquo, depresso, sed ad angulum prominulo et inaequaliter bilobato: lobo anteriore humili et obtuso, altero in dentem subacutam producto, ungue rufulo, longo et valido, simplici. Pedes robusti, albo nigroque hirsuti, fulvo-rufescentes, femoribus anticis fere usque ad basin, posticis ad apicem nigris, pedes 1<sup>i</sup> paris reliquis longiores, patella insigniter longa, superne saltem ad basin deplanata, tibia subtus aculeis validis et longis 3—3, aculeoque laterali interiore subapicali, metatarso aculeis paulo longioribus 2—2 subtus armatis, pedes 2<sup>i</sup> paris multo breviores, sed similiter aculeati. Pedes-maxillares graciles et longi, fulvo-rufuli, tarso nigro, parce albo-pilosi, tibia intus longe albo-crinita,

femore gracili et curvato, superne aculeis binis uniseriatis munito, patella longiore quam latiore subparallela, tibia patella vix brevior, paulo angustiore, apophysi apicali brevi, simplici et acuta, extus instructa, tarso parvo et anguste ovato, bulbo simplici, plano.

Stat. 67, Dirk Hartog, Brown Station.

A speciebus cunctis numerosis hujus generis ex Australia orientali chelis maris subtus convexis, sed tuberculo subapicali carentibus differt.

*Opisthonus machaerodus* n. sp.

♂. Long. 5 mm (fere omnino depilis). Cephalothorax crassus, nigro-castaneus, antice, pone oculos anticos, paulo dilutior et rufescenti-tinctus, fere laevis, cervino-pubescent (?) , parte thoracica in declivitate vitta lata semicirculari albo-pilosa notata, parte cephalica tuberculo postico humillimo vix expresso. Pili oculorum rubri. Clypeus parce setosus fere nudus. Oculi antici apicibus in lineam vix recurvam, laterales a mediis spatio oculo laterali vix minore distantes. Abdomen oblongum, supra nigrum, cervino-pubescent (?), vitta media dilutior, saltem in dimidio apicali crenulata, albido-pilosa, ornatum, subtus paulo dilutius, sed vitta media confusa obscuriore notatum et albido-pilosum. Partes oris et sternum nigra, hoc




Fig. 14. *Opisthonus machaerodus* n. sp. A Chelae maris superne visae. B Chelae maris inferne visae.

longe albo-pilosum. Chelae robustae, longae, attenuatae et divaricatae, supra fusco-rufulae, vix aeneo-tinctae, parce cinereo-crinatae, supra ad apicem dente valido, curvato et attenuato, sed obtuso, subtus in dimidio apicali, prope marginem exteriorem, dente fere simili, sed obtusiore et valde incurvo armatae, margine inferiore sulci dente angulari nigro validissimo erecto, levissime antice arcuato atque acuto, munito, ungue

longo, ad basin crasso et supra, prope basin, convexo et obtusissime inaequali. Pedes nigro-castanei, coxis femoribusque ad basin, praesertim posticis, et patella 1<sup>i</sup> paris, in dimidio basali, dilutioribus et rufescentibus, longissime et parce nigro alboque hirsuti. Pedes 1<sup>i</sup> paris reliquis multo longiores, patella insigniter longa tibia vix brevior, tibia subtus aculeis sat brevibus 3—3 armata sed lateralibus carente, metatarso, tibia multo brevior et tarso circiter aequilongo, subtus aculeis validioribus singulariter elevatis, 2—2, armato. Pedes 2<sup>i</sup> paris anticis multo breviores, tibia subtus aculeis trinis uniseriatis aculeoque laterali interiore minore, metatarso aculeis debilioribus 2—2 armatis. Pedes-maxillares graciles et longi, obscure fulvo-rufuli, apice leviter infuscati, albo-pilosi et hirsuti, femore longo,

gracili et curvato, supra, in dimidio apicali, aculeis parvis binis, munito, patella longiore quam latiore, tibia patella circiter  $\frac{1}{3}$  brevior, extus ad angulum leviter prominula et prope radicem tarsi apophysi brevi et tenui munita, tarso parvo tibia cum patella brevior et vix latiore, bulbo simplici, plano et ovato.

Stat. 102, Midland.

Ab *O. parcedentato* L. KOCH, specie mihi ignota, cui imprimis affinis videtur, differt sec. L. KOCH oculis lateralibus anticis a mediis distantioribus, tibiis metatarsisque anticis subtus brevius aculeatis et tibia 1<sup>a</sup> paris aculeo laterali carente, armatura chelarum paulo alia.

## Simaetheae.

### Gen. *Simaethula*.

#### *Simaethula chalcops* n. sp.

♂. Long. 3 mm. Cephalothorax latior quam longior, antice posticeque valde attenuatus, utrinque ample rotundus, nigricans, superne minutissime granulosus et pilis parvis pronis et obtusis cinereo-rubris conspersus, utrinque in declivitate longius et crebrius albido-pilosus. Oculi antiqui aenei, apicibus in lineam subrectam, laterales a mediis spatio oculo non minore distantes. Pili oculorum breves cinereo-rubri. Clypeus creberrime et longius albo-nitido-barbatus. Abdomen breviter ovatum, antice posticeque rotundum, superne deplanatum, duriusculum et nitidum, fusco-castaneum, pilis clavatis minutissimis albo-micantibus conspersum et maculis flavo-nitido-pilosis marmoratum, subtus obscure testaceum et subglabrum. Chelae fusco-rufulae, intus laeves, extus minutissime rugosae, attenuatae et divaricatae, marginibus sulci longe obliquis dentibus remotissimis, margine superiore dente angulari nigro, magno, attenuato sed obtuso et leviter curvato, inferiore carinula parva obliqua, ad angulum leviter prominula sed obtusa, instructis, ungue rufulo, valido, longo et simplici. Partes oris nigro-castaneae, laminae ad apicem leviter dilutiores. Sternum parvum, nigrum, longe albo-setosum. Pedes 1<sup>i</sup> paris robustissimi, femore late clavato, nigro-castanei, patella tarsoque paulo dilutioribus et ferrugineis, breviter fulvo-pilosi et nigro-setosi, femore utrinque subglabro, subtus longe albo-crinito, tibia subtus longe nigro-crinita et aculeis parvis 2—1 vel 2—2 armata, metatarso tarso haud longiore, subtus aculeis validis et longis 2—2 munito. Reliqui pedes multo minores, lutei, coxis femoribusque obscure fulvis, tibiis metatarsisque apice tenuiter nigro-annulatis, pedes 2<sup>i</sup> paris parce aculeati, tibia aculeo inferiore, metatarso aculeis basilaribus binis munitis, pedes quatuor postici omnino mutici. Pedes-maxillares graciles, obscure fulvi,

cinereo-setosi, femore longo, curvato et compresso. subtus subcarinato et setis crebre uniseriatis munito, patella evidenter longiore quam latiore, tibia patella brevior, intus fasciculo setarum nigrarum longissimarum, extus ad basin, juxta patellam, aculeo vel apophysi gracili et divaricato. munita. tarso angusto et sat longo, apice leviter ampliato, obtuso et bulbum superante, bulbo nigro simplici, ad basin rotundo, apicem versus sensim acuminato.

Stat. 109, Subiaco N.

A *S. (Homalattis) opulenta* et *auronitenti* L. KOCH tibiis anticis subtus aculeatis, a *S. (Homalattis) aurata* et *violacea* L. KOCH et *ianthina* E. SIMON oculis parvis posticis minus remotis et pictura dorsali obscuriore differt.

# Catalogue général des Araignées actuellement connues de l'Australie occidentale.

(La pagination se rapporte aux espèces décrites ou citées dans ce mémoire dont la première partie a été publiée en 1908 comme Lief. 12 du Bd. I.)

## Fam. Aviculariidae.

### Subfam. Actinopodinae.

<i>Missulena occatoria</i> WALCK. (teste HOGG)	I 366
<i>M. crassa</i> (CAMBR.)	I 366
<i>M. granulosa</i> (CAMBR.)	I 366
<i>M. insignis</i> (CAMBR.)	
<i>M. incerta</i> (CAMBR.)	

### Subfam. Ctenizinae.

<i>Cantuarina Hoggi</i> E. S. (n. sp.)	I 361
<i>Idiosoma sigillatum</i> CAMBR.	I 366
<i>Anidiops Manstridgei</i> POCCOCK	I 366
<i>Eucyrtops latior</i> (CAMBR.)	I 366
<i>Ayanippe occidentalis</i> HOGG.	I 366
<i>Proshermacha tigrina</i> E. S. (n. sp.)	I 363
<i>P. subarmata</i> E. S. (n. sp.)	I 364

### Subfam. Barychelinae.

<i>Synothele Michaelsoni</i> E. S. (n. sp.)	I 364
<i>Idiommatia Blackwalli</i> (CAMBR.)	I 365

### Subfam. Aviculariinae.

<i>Selenocosmia Stirlingi</i> HOGG	I 366
------------------------------------	-------

### Subfam. Diplurinae.

<i>Palueragrus fugax</i> E. S. (n. sp.)	I 365
---	-------

## Fam. Uloboridae.

<i>Dinopis unicolor</i> L. K.	I 366
-------------------------------	-------

## Fam. Dictynidae.

<i>Amaurobius robustus</i> L. K.	I 366
<i>A. microps</i> E. S. (n. sp.)	I 366
<i>Phryganoporus gausapatius occidentalis</i> E. S. (n. subsp.)	I 367
<i>P. tubicola</i> E. S. (n. sp.)	I 367
<i>P. nigrinus</i> E. S. (n. sp.)	I 368

Die Fauna Südwest-Australiens. II.

## *Aphytoschaema virgosum* E. S. (n. sp.)

<i>A. armigerum</i> E. S. (n. sp.)	I 369
<i>A. storeniforme</i> E. S. (n. sp.)	I 371
<i>A. veliferum</i> E. S. (n. sp.)	I 372
<i>A. vultuosum</i> E. S. (n. sp.)	I 373
<i>A. albicauda</i> E. S. (n. sp.)	I 374
<i>A. bivittatum</i> E. S. (n. sp.)	I 374
<i>A. cryphociforme</i> E. S. (n. sp.)	I 374
<i>Syrorisa seriata</i> E. S. (n. sp.)	I 376
<i>Epimecinus tegerarioides</i> E. S. (n. sp.)	I 376
<i>E. volueripes</i> E. S. (n. sp.)	I 377
<i>Lathyrarcha tetrica</i> E. S. (n. sp.)	I 377
<i>Calterophthalmus lirus</i> E. S. (n. sp.)	I 378
<i>Dictyna ananulax</i> E. S. (n. sp.)	I 379

## Fam. Oonopidae.

<i>Gamasomorpha sercula</i> E. S. (n. sp.)	I 379
--	-------

## Fam. Dysderidae.

<i>Ariadna thyranthina</i> E. S. (n. sp.)	I 380
---	-------

## Fam. Drassidae.

### Subfam. Hemielocinae.

<i>Rebilus castaneus</i> E. S. (n. sp.)	I 382
<i>Hemieloea insidiosa</i> E. S. (n. sp.)	I 382
<i>H. Michaelsoni</i> E. S. (n. sp.)	I 383
<i>H. sublimbata</i> E. S. (n. sp.)	I 383
<i>H. crocotila</i> E. S. (n. sp.)	I 384
<i>H. semiplumosa</i> E. S. (n. sp.)	I 385
<i>Corinaethes campestratus</i> E. S. (n. sp.)	I 385
<i>Trachytrema castaneum</i> E. S. (n. sp.)	II 157

### Subfam. Drassodinae.

<i>Drassodes respersus</i> E. S. (n. sp.)	I 387
<i>D. petilus</i> E. S. (n. sp.)	I 388
<i>D. nugatorius</i> E. S. (n. sp.)	I 389
<i>D. micaceus</i> E. S. (n. sp.)	I 390
<i>D. musteculus</i> E. S. (n. sp.)	I 390



<i>Homocothele micans</i> E. S. (n. sp.)	I 392
<i>Gnaphosoides albopunctata</i> HOGG	I 394
<i>Melanophora flavens</i> (L. K.)	I 393
<i>Megamyrmaecion penicillatum</i> E. S. (n. sp.)	I 394
<i>M. vestigator</i> E. S. (n. sp.)	I 395
<i>M. austrinum</i> E. S. (n. sp.)	I 396
<i>M. echemophthalmus</i> E. S. (n. sp.)	I 396
<i>M. perpusillum</i> E. S. (n. sp.)	I 397
<i>Aphantaulax scotophaeus</i> E. S. (n. sp.)	I 397
<i>Sergiolus australianus</i> E. S. (n. sp.)	I 398
<i>Lampona punctigera</i> E. S. (n. sp.)	I 399
<i>L. brevipes</i> L. K.	I 399
<i>L. foliifera</i> E. S. (n. sp.)	I 400
<i>L. obnubila</i> E. S. (n. sp.)	I 400
<i>L. cylindrata</i> (L. K.)	I 401
<i>L. paupercula</i> E. S. (n. sp.)	I 402
<i>L. quinqueplagiata</i> E. S. (n. sp.)	I 403

**Fam. Zodariidae.**

<i>Storena variegata</i> CAMER.	I 406
<i>S. scintillans</i> CAMER.	I 406
<i>S. tetrica</i> E. S. (n. sp.)	I 403
<i>S. torosa</i> E. S. (n. sp.)	I 404
<i>S. eximia</i> E. S. (n. sp.)	I 405
<i>S. tricolor</i> E. S. (n. sp.)	I 405

**Fam. Hersiliidae.**

<i>Tama brachygura</i> E. S. (n. sp.)	I 406
---------------------------------------	-------

**Fam. Pholcidae.**

<i>Pholcus phalangoides</i> (FUESLIN)	I 406
<i>Trichocyclus nigropunctatus</i> E. S. (n. sp.)	I 407

**Fam. Theridiidae.**

<i>Moneta longicauda</i> E. S. (n. sp.)	I 407
<i>Euryopsis elegans</i> KEYSERL.	I 408
<i>E. maga</i> E. S. (n. sp.)	I 408
<i>Theridion extrilidum</i> KEYSERL.	I 409
<i>T. mortuale</i> E. S. (n. sp.)	I 409
<i>T. subpingue</i> E. S. (n. sp.)	I 410
<i>T. Hartmeyer</i> E. S. (n. sp.)	I 410
<i>Diploca austera</i> E. S. (n. sp.)	I 411
<i>Latrodectus Hasselti</i> THORELL	I 411
<i>Crustulum bicruciatum</i> E. S. (n. sp.)	I 412
<i>Teutana grossa</i> (C. K.) (n. sp.)	I 412

<i>T. adumbrata</i> E. S. (n. sp.)	I 413
<i>Lithyphantes niveosignatus</i> E. S.	I 413
<i>L. octonotatus</i> E. S. (n. sp.)	I 414
<i>Euoplognatha bidens</i> E. S. (n. sp.)	I 414

**Fam. Argiopidae.****Subfam. Linyphiinae.**

<i>Delorhhipis erythrocephalus</i> E. S. (n. sp.)	I 415
<i>Gonutium</i> (?) <i>lividulum</i> E. S. (n. sp.)	I 416
<i>Ceratiopsis melanura</i> E. S. (n. sp.)	I 416
<i>Linyphia cupidinea</i> E. S. (n. sp.)	I 417
<i>Laetesia mollita</i> E. S. (n. sp.)	I 419
<i>L. egregia</i> E. S. (n. sp.)	I 419

**Subfam. Tetragnathinae.**

<i>Tetragnatha luteocincta</i> E. S. (n. sp.)	I 420
<i>T. maeandrata</i> E. S. (n. sp.)	I 421
<i>Nanometa gentilis</i> E. S. (n. sp.)	I 421

**Subfam. Nephilinae.**

<i>Nephila imperatrix</i> L. K. <sup>1)</sup>	I 422
---	-------

**Subfam. Argiopinae.**

<i>Aryiope trifasciata</i> (FORSKÅL)	I 423
<i>A. protensa</i> L. K.	I 423
<i>Gea theridioides</i> (L. K.) <sup>2)</sup>	I 423
<i>Cyclosa bacilliformis</i> E. S. (n. sp.)	I 423
<i>Larinia churrucentris</i> E. S. (n. sp.)	I 424
<i>Aranus senicautatus</i> E. S. (n. sp.) <sup>2)</sup>	I 425
<i>A. senicautatus simplex</i> (n. subsp.)	I 426
<i>A. cyphoxis</i> E. S. (n. sp.)	I 426
<i>A. amblygyphus</i> E. S. (n. sp.)	I 427
<i>A. necospina</i> (KEYSERL.)	I 427
<i>Acroaspis olorina</i> KARSCH	
<i>Gasteracantha minima</i> THORELL	I 428
<i>Paraplectanoides cerulea</i> E. S. (n. sp.)	I 428
<i>Polyg. salebrosus</i> RAINBOW	I 429
<i>Cebrenia dubia</i> (CAMER.)	I 429
<i>Arcys nitidiceps</i> E. S. (n. sp.) <sup>3)</sup>	I 429
<i>Dolophones conifer</i> (KEYSERL.) <sup>4)</sup>	I 429
<i>Billina atrita</i> E. S. (n. sp.)	I 430

**Fam. Thomisidae.****Subfam. Misumeninae.**

<i>Bomis laeata</i> L. K.	I 430
<i>Tharpyia campestrata</i> L. K.	I 431

1) Sans doute l'espèce citée par KARSCH sous le nom de *N. nigritarsis* L. KOCH.

2) Les deux espèces citées par KARSCH sous les noms d'*Epeira producta* et *micronata* L. KOCH, se rapportent probablement à *P.A. senicautatus*.

3) Sans doute l'espèce citée par KARSCH sous le nom d'*Arcys cornutus* L. KOCH.

4) KARSCH cite en outre *Dolophones (Tholia) clypeatus* L. K., *testudineus* L. KOCH et *nusalis* BUTLER, mais les déterminations sont trop incertaines.

<i>Cymbacha ocellata</i> L. K. (fide KARSCH)	
<i>Xysticus periscelis</i> E. S. (n. sp.)	I 431
<i>Diaca olivacea</i> L. K.	I 432
<i>D. multimaclulata</i> RAINBOW	I 432

**Subfam. Stephanopsinae.**

<i>Stephanopsis Cambridgei</i> TH.	I 432
<i>S. palliolata</i> E. S. (n. sp.) <sup>1)</sup>	I 432
<i>Sidyina trapezia</i> (L. K.)	I 433
<i>S. Kochi</i> E. S. (n. sp.)	I 434

**Fam. Clubionidae.****Subfam. Selenopinae.**

<i>Selenops australiensis</i> L. K.	II 157
-------------------------------------	--------

**Subfam. Sparassinae.**

<i>Delena cancerides</i> WALCK.	I 435
<i>Eodclera nigrifrons</i> E. S. (n. sp.)	I 435
<i>Zachria flavicoma</i> L. K.	I 436
<i>Isopoda insignis</i> (THORELL)	I 437
<i>I. Woodwardi</i> E. S. (n. sp.)	I 437
<i>I. nigrigularis</i> E. S. (n. sp.)	I 438
<i>I. Leishmanni</i> HOGG	I 438
<i>I. Leishmanni Hoggi</i> E. S. (n. subsp.)	I 439
<i>I. cerussata</i> E. S. (n. sp.)	I 439
<i>I. cana</i> E. S. (n. sp.)	I 440
<i>I. pengellya</i> HOGG	I 437—439
<i>I. Sundersi</i> HOGG	I 437
<i>Pediana tenuis</i> HOGG	I 441
<i>P. occidentalis</i> HOGG	I 441
<i>Olios calligaster</i> (THORELL)	I 442
<i>O. pictus</i> L. K. (fide KARSCH)	I 442
<i>O. diana</i> L. K. (fide HOGG)	I 442
<i>Heteropoda regia</i> FABR.	I 442

**Subfam. Clubioninae.**

<i>Clubiona robusta</i> L. K.	II 159
<i>C. cycladata</i> E. S. (n. sp.)	II 160
<i>C. munis</i> E. S. (n. sp.)	II 160
<i>C. laudabilis</i> E. S. (n. sp.)	II 161
<i>Chiracanthium nervosum</i> E. S. (n. sp.)	II 161
<i>C. pennuliferum</i> E. S. (n. sp.)	II 162
<i>C. brevicelecaratum</i> L. K.	II 162

**Subfam. Cteninae.**

<i>Argoctenus pictus</i> L. K.	II 164
<i>A. nebulosus</i> E. S. (n. sp.)	II 163
<i>A. hystriculus</i> E. S. (n. sp.)	II 164
<i>Elassoctenus harpax</i> E. S. (n. sp.)	II 165
<i>Hestinodeuma umbigua</i> E. S. (n. sp.)	II 166
<i>H. latevitata</i> E. S. (n. sp.)	II 167

<i>Ctenonorma lineatum</i> E. S.	II 168
<i>Miturga occidentalis</i> E. S. (n. sp.)	II 169
<i>M. ferina</i> E. S. (n. sp.)	II 170
<i>M. catographa</i> E. S. (n. sp.)	II 170
<i>M. Whistleri</i> E. S. (n. sp.)	II 171
<i>M. impedita</i> E. S. (n. sp.)	II 171
<i>M. agelenina</i> E. S. (n. sp.)	II 172
<i>Diaplograptus striola</i> E. S. (n. sp.)	II 175

**Subfam. Molyeriinae.**

<i>Myandra biceincta</i> E. S. (n. sp.)	I 442
<i>Molyeria splendida</i> E. S. (n. sp.)	I 444
<i>M. flavipes</i> E. S. (n. sp.)	I 444
<i>M. alboplagiata</i> E. S. (n. sp.)	I 445
<i>Homonius quadricauda</i> E. S. (n. sp.)	I 445
<i>Cerygera cursitans</i> E. S. (n. sp.)	II 158

**Subfam. Micariinae.**

<i>Supuina Michaelseni</i> E. S. (n. sp.)	II 175
<i>S. smaragdinea</i> E. S. (n. sp.)	II 176
<i>Liparo-chrysis resplendens</i> E. S. (n. sp.)	II 177

**Subfam. Corinninae.**

<i>Asadipus nitidiceps</i> E. S. (n. sp.)	II 178
<i>Aristerus phaleratus</i> E. S. (n. sp.)	II 179

**Fam. Agelenidae.****Subfam. Nicodaminae.**

<i>Nicodamus bicolor</i> (L. K.)	II 180
----------------------------------	--------

**Subfam. Cyboeinae.**

<i>Desis Hartmeyeri</i> E. S. (n. sp.)	II 180
--	--------

**Subfam. Hahninae.**

<i>Scotopsilus</i> sp.?	II 181
-------------------------	--------

**Fam. Pisauridae.**

<i>Dolomedes facetus</i> L. K.	II 181
<i>D. stilatus</i> KARSCH	II 181

**Fam. Lycosidae.**

<i>Lycosa Leuckarti</i> (THORELL)	II 182
<i>L. Christopheri</i> E. S. (n. sp.)	II 182
<i>L. Woodwardi</i> E. S. (n. sp.)	II 182
<i>L. immansueta</i> E. S. (n. sp.)	II 183
<i>L. dimota</i> E. S. (n. sp.)	II 184
<i>L. pullastra</i> E. S. (n. sp.)	II 184
<i>L. marcentior</i> E. S. (n. sp.)	II 185
<i>L. segregis</i> E. S. (n. sp.)	II 186
<i>L. propitia</i> E. S. (n. sp.)	II 186

1) KARSCH cite aussi *Stephanopsis bicornis* L. KOCH et *altifrons* CAMBR., même observation.

<i>L. percauta</i> E. S. (n. sp.)	II 187
<i>L. impedita</i> E. S. (n. sp.)	II 187
<i>L. oraria</i> L. K.	II 188
<i>L. sibyllina</i> E. S. (n. sp.)	II 188
<i>L. properipes</i> E. S. (n. sp.)	II 189
<i>L. Phegeia</i> E. S. (n. sp.)	II 189
<i>L. meracula</i> E. S. (n. sp.)	II 190
<i>Pardosa praecelox</i> E. S. (n. sp.)	II 191
<i>Artoria flavimanus</i> E. S. (n. sp.)	II 192
<i>A. cingulipes</i> E. S. (n. sp.)	II 193
<i>A. taeniifera</i> E. S. (n. sp.)	II 193

### Fam. Oxyopidae.

<i>Oxyopes</i> . . . sp.	II 194
--------------------------	--------

### Fam. Salticidae.

#### Salticidae pluridentati.

<i>Astia tristicula</i> E. S. (n. sp.)	II 194
<i>Helpis occidentalis</i> E. S. (n. sp.)	II 195
<i>Adoxotoma nigroolivacea</i> E. S. (n. sp.)	II 196
<i>A. chionopogon</i> E. S. (n. sp.)	II 196

#### Salticidae unidentati.

<i>Saitis Michaelsenii</i> E. S. (n. sp.)	II 197
<i>S. Michaelsenii obscurior</i> E. S. (n. subsp.)	II 198
<i>S. heteropogon</i> E. S. (n. sp.)	II 198
<i>Breda jovialis</i> (L. K.)	II 198
<i>Holoplatys planissima</i> (L. K.)	II 198
<i>H. quinquecingulata</i> E. S. (n. sp.)	II 199
<i>H. fracticittata</i> E. S. (n. sp.)	II 199
<i>Oerisoma leucocomis</i> (L. K.)	II 200
<i>Muxiris carinatus</i> E. S. (n. sp.)	II 201
<i>Chynotis viduus</i> (L. K.)	II 201
<i>C. albopictus</i> E. S. (n. sp.)	II 201
<i>Habrocestum chrysomelas</i> E. S. (n. sp.)	II 201
<i>H. speculiferum</i> E. S. (n. sp.)	II 202
<i>H. speciosum</i> (CAMBR.)	II 202
<i>Engasmia chlorophthalma</i> E. S. (n. sp.)	II 203

#### Salticidae ffsidentati.

<i>Sereuea spinibarbis</i> E. S. (n. sp.)	II 204
<i>Opisthoneus deracus</i> E. S. (n. sp.)	II 205
<i>O. machacrodus</i> E. S. (n. sp.)	II 206
<i>Simaethula chalcops</i> E. S. (n. sp.)	II 207

## Genres et espèces étrangers à l'Australie occidentale décrits ou analysés dans ce mémoire.

<i>Drussodes maudae</i> E. S. (ex ins. Se- chellae)	I 386
<i>D. perexiguus</i> E. S. (ex N. Caledonia)	I 387
<i>D. sorritus</i> E. S. (n. sp.) (ex Tasmania)	I 391
<i>D. dimotus</i> E. S. (n. sp.) (ex Victoria)	I 391
<i>Molyeria mammosa</i> (CAMBR.) (ex Sydney)	I 442

<i>Miturgina</i> (genus)	II 163
<i>Odomasta</i> (n. gen.) (Typus <i>O. guttipes</i> E. S.)	II 167
<i>Miturga Thorelli</i> E. S. (n. sp.) (ex Cook town)	II 173
<i>M. serera</i> E. S. (n. sp.) (ex Victoria)	II 174